

Salud Pública I
 Historia natural de enfermedad de sífilis.

| Periodo Pre - Patogenico | Periodo Patogenico |
|--|--|
| <p>Agente: Esquirroqueta, <i>Trichomonas trichomonas</i></p> <p>Hosted: Las mujeres en edad fértil y recién nacidos.</p> <p>Medio Ambiente: Personas (mujeres) de niveles socio economicos bajos y con falta de una atención medica.</p> | <p>Etapa Primaria: 6 a 10 sem. Una úlcera roza llamado chancro, adenopatias y las lesiones de condilomata o/tx.</p> <p>Etapa secundaria: 2 a 12 sem. Contagiosa con Erupción posivros eritematosos, condilomata palmos y plantas.</p> <p>Etapa terciaria: Desaparece las lesiones apariciones de secuelas, dura muchos años.</p> |

| Prevención Primaria Promoción y fomento | Protección Especifica | Prevención secundaria Dx precoz y tx oportuno | Limitación daño | Prevención Tercera Reintegración |
|--|--|--|--|---|
| <p>Educación: Un control Prenatal, abortos, Partos Pre-terminados.</p> <p>Educación en ETS</p> <p>Incentivar el uso de los condones.</p> | <ul style="list-style-type: none"> - No hay alguna vacuna. - No existe la inmunidad definitiva. - Control Prenatal - Fidelidad de pareja | <ul style="list-style-type: none"> - Hc completa - Antecedentes de familiares - Laboratorios VDRL, RPR, Rx, LCR. - Penicilina sodica, Procainas, Benzathinica. | <ul style="list-style-type: none"> - Dx precoz - Tx oportuna | <p>Presencia de anomalías en examen físico.</p> <p>Organos anti-dos, Ovario y aditivos.</p> |