

HISTORIA NATURAL DE LA ENFERMEDAD SIFILIS

=PERIODO PREPATOGENICO=

FACTORES DE RIESGO

AGENTE

Biológico: Treponema Pallidum.

HUESPED

múltiples parejas sexuales, y relaciones sexuales sin protección y bebés contagiados por sus padres.

AMBIENTE:

falta de conocimientos acerca de la prevención de esta. Ambiente de múltiples parejas conyugales.

=Periodo patogénico=



PREVENCIÓN PRIMARIA

PREVENCIÓN SECUNDARIA

PREVENCIÓN TERCIARIA

Promoción de la salud	Protección específica	Diagnostico temprano	Tratamiento oportuno	Limitación de daño	Rehabilitación
<ul style="list-style-type: none"> Pláticas informativas en escuelas y centros públicos orientación Enseñanza y promoción del uso de preventivos 	abstinencia sexual, monogamia, no consumir alcohol ni drogas, el uso de condones reduce el riesgo de contraer un ETS	Se diagnostica haciendo un examen físico, un análisis de sangre y de una muestra de líquido tomado de una lesión.	Se trata con penicilina; se aplican antibióticos para los alérgicos a la misma.	Dejar de tener relaciones sexuales. Usar anticonceptivos	Terapias con asesoría de personal médico y familiares que le ayuden a aceptar y manejar su incapacidad, ceguera o infertilidad