

UNIVERSIDAD DEL SURESTE

LICENCIATURA:

MEDICINA HUMANA

CATEDRÁTICO:

DRA. IRMA SÁNCHEZ PRIETO

MATERIA:

MEDICINA LEGAL

ALUMNO:

JOSUÉ DE LEÓN LÓPEZ

FECHA:

16/10/21

LUGAR:

TAPACHULA CHIAPAS

Es lo primero a considerar en la valoración de la gravedad de una quemadura. De eso dependerá la derivación a un centro especializado. Las quemaduras moderadas y graves deben ser atendidas en un hospital.

Regla de los 9 de Wallace: es un método que se utiliza para calcular la extensión cutánea quemada en un paciente. Consiste en dividir la superficie del cuerpo en áreas equivalentes al 9% de la superficie corporal total quemada (SCTQ) o por múltiplos de 9.

Regla de los "nueves":

- ✓ Cabeza: 9% (lactantes 19%)
- ✓ Cada brazo: 9%
- ✓ Cada pierna: 18% (lactantes 13%)
- ✓ Tronco anterior: 18%
- ✓ Tronco posterior: 18%
- ✓ Genitales: 1%

ADULTOS: "Regla de los 9 de Wallace"

- ✓ Cabeza y cuello:
 - ✓ $9\% \times 1 = 9\%$
- ✓ Torax (ant)
 - ✓ $9\% \times 1 = 9\%$
- ✓ Abdomen(ant)
 - ✓ $9\% \times 1 = 9\%$
- ✓ - Espalda sup (post) $9\% \times 1 = 9\%$
- ✓ - Espalda inf (post)
 - ✓ $9\% \times 1 = 9\%$
- ✓ Cada Ext Sup:
 - ✓ $9\% \times 2 = 18\%$
- ✓ - Cada Ext Int:
 - ✓ $18\% \times 2 = 36\%$
- ✓ - Genitales:
 - ✓ $1\% \times 1 = 1\%$
- ✓ TOTAL: 100%

