

SHOCK ANAFILACTICO

EMMANUEL GALDAMEZ GONZALEZ
DRA: GUADALUPE VIDAL CASTILLO

1 DEFINICION

Reacción alérgica severa que produce síntomas y signos de carácter cutáneo y sistémicos como consecuencia de la administración de sustancias extrañas.

El cuadro completo presenta reacción urticariforme, angioedema, hipotensión y broncoespasmo.

2 CLINICA

Son comunes las reacciones cutáneas, >90% de pacientes presentan urticaria con o sin eritema y prurito.

En dicho estadio se presenta: angioedema, sensación de calor, hormigueo palmoplantar, congestión nasal, irritación, prurito ocular, lagrimeo, inyección conjuntival



3 EXPLORACION FISICA

Los pacientes presentan un estado considerable de inestabilidad debido al intenso prurito.

Esto se acompaña de ansiedad, temor y en ocasiones sensación subjetiva de frío.

4 TRATAMIENTO

ANTE UN PTE. QUE INICIA CRISIS DE CARÁCTER NO SEVERO:

Corticoides.
Antihistamínicos.
Oxígeno a alto flujo.
VVP y monitorización.

5 PREVENCION

La administración preventiva de antihistamínicos no supone garantía alguna.

Si se realiza la administración de fármacos sospechoso deberá contarse con la presencia del médico y el equipo necesario para el tto de la potencial reacción(carro de parada.)

