


REFERENCIAS BIBLIOGRAFICAS

ALUMNA: DIANA CITLALI CRUZ RIOS

MAESTRA: BEATRIZ

ASIGNATURA SUBMODULO 1

QUINTO SEMESTRE, BACHILLERATO EN ENFERMERIA



AMENORREA PRIMARIA

La amenorrea es la ausencia de menstruación, que a menudo se define como la ausencia de uno o más períodos menstruales.

¿Qué es la amenorrea primaria?

La amenorrea primaria se refiere a la ausencia de menstruación en una persona que no ha menstruado hasta los 15 años.

Causa

Las causas más comunes de la amenorrea primaria están relacionadas con los niveles hormonales, aunque los problemas anatómicos también pueden causar amenorrea.

Diagnostico

El médico te realizará un examen pélvico para comprobar si hay algún problema en los órganos reproductivos.

Si nunca has menstruado, es probable que el médico te revise las mamas y los genitales para ver si manifiestas los cambios normales de la pubertad.

Pruebas diagnósticas.

¿Qué pruebas se hacen para su diagnóstico?

Prueba de embarazo.

Prueba de la función tiroidea.

Prueba de la función ovárica.

Prueba de prolactina.

BIBLIOGRAFIA

<https://www.elsevier.es/es-revista-progresos-obstetricia-ginecologia-151-articulo-protocolo-sego-amenorrea-primaria-secundaria--S0304501313000988>

AMENORREA
SECUNDARIA
DISMENORREA
Y TENSION
PREMESTRUAL

La amenorrea secundaria es la ausencia de tres o más períodos seguidos en una persona que ha menstruado previamente.

CAUSAS

A pesar de que la causa más común de la amenorrea secundaria es el embarazo, también puede ocurrir por problemas hormonales.

De igual forma se puede tener amenorrea por razones naturales, tales como:

Lactancia

Menopausia

FACTORES
DE
RIESGO

Entre los factores que pueden aumentar el riesgo de padecer amenorrea, se encuentran los siguientes:

Antecedentes familiares.

Antecedentes de determinados procedimientos ginecológicos.

Trastornos alimentarios.

Entrenamiento atlético.

DISMENORREA

Se define como dolores intensos durante la menstruación.

CAUSAS

Las causas son muy diversas desde malformaciones congénitas a procesos tumorales.

Aunque la más frecuente es la endometriosis.

BIBLIOGRAFIA

<https://www.elsevier.es/es-revista-progresos-obstetricia-ginecologia-151-articulo-protocolo-sego-amenorrea-primaria-secundaria--S0304501313000988>