



**Nombre de alumnos: Ochoa Alvarado
Andrea**

Nombre del profesor: Beatriz Gordillo López

Nombre del trabajo: Súper Nota

Materia: Submodulo 2

Grado: 5

Grupo: A

Comitán de Domínguez Chiapas.

VACUNA ROTAVIRUS.

- ♥ **Este virus** es una de las principales causas de la diarrea y deshidratación en niños menores de 5 años, la transmisión del rotavirus se produce de persona a persona o a través del agua y los alimentos contaminados o superficies contaminadas.

VIA DE APLICACIÓN

- **Vía oral.**

SITIO DE APLICACIÓN

- **Por la boca.**

DOSIS

- **1.5 0 2.5**

EDAD DE APLICACIÓN

- **Se administra en 3 dosis a los 2, 4 y 6 meses de edad.**

EDAD DE APLICACIÓN

Se recomienda aplicar en estas edades


- **La primera a los 2 meses de vida y la segunda a los 4 meses.**
- **La última dosis debe de administrarse antes de los 6 meses.**

CONTRAINDICACIONES

- **No se recomienda administrar la vacuna en los siguientes casos: no debe de administrarse a pacientes con hipersensibilidad grave a cualquier componente de la vacuna o a quienes hubieran experimentado reacción adversa grave con la dosis anterior.**

INFORMACIÓN

- **Los efectos adversos más frecuentes son vómitos, diarrea y fiebre moderada, todos ellos leves, Se han comunicado casos aislados de broncoespasmo, urticaria y de invaginación intestinal tras la administración de esta vacuna.**



VACUNA NEUMOCOCICA CONJUGADA.

- ✓ La vacuna contra los neumococidos ofrece protección, contra el estreptococo *Streptococcus pneumoniae*, el cual puede causar meningitis y neumonía y brinda protección a 13 bacterias más.

VIA DE APLICACIÓN

- Vía intramuscular.

SITIO DE APLICACIÓN

- Tercio medio de la cara anterolateral externa del muslo en niños menores de 1 año, en mayores de 1 año en la región deltoidea.

DOSIS

- 0.5 ML o 10 UG

EDAD DE APLICACIÓN

- 2,4 y 6 meses.
- Primer refuerzo.
- Segundo refuerzo 11 y 14 años.
- Posterior mente cada 10 años.

CONTRAINDICACIONES

- No deben vacunarse aquellos niños que hayan presentado una reacción alérgica grave (anafilaxia) en una dosis previa o que sean alérgicos a alguno de los componentes incluidos en ella. En los niños que presenten una enfermedad aguda grave debe retrasarse la vacunación hasta su mejoría. Un catarro o una enfermedad leve no son motivos para retrasar la vacunación.

INFORMACIÓN

La vacuna puede dar estos síntomas:

- sensibilidad.
- enrojecimiento o dolor en el lugar de la inyección.
- fiebre moderada.
- dolores musculares.



Vacuna influenza.

- ♥ **La vacuna viral contra la gripe**, para sus uso intramuscular, es una suspensión estéril prepara a partir del virus de la influenza propagados de los embriones de pollos los cuales son friccionados, inactivados y purificados.

VIA DE APLICACIÓN

- **Intramuscular deltoides mayores de 1 año.**

SITIO DE APLICACIÓN

- **Tercio medio de la cara anterolateral del muslo.**

DOSIS

- **0.5 ML**

EDAD DE APLICACIÓN

- **Primera a los 2 meses.**
- **Segunda a los 7 meses.**
- **Revacunación anual hasta los 59 meses.**

CONTRAINDICACIONES

- **Las personas que tienen alergias graves y potencialmente mortales a cualquiera de los ingredientes de la vacuna contra la influenza (excepto la proteína de huevo) no deben recibir esa vacuna. Esto puede incluir gelatina, antibióticos u otros ingredientes.**

INFORMACION

SINTOMAS QUE PUEDEN DAR:

- **dolor, enrojecimiento o inflamación donde se administró la inyección.**
- **dolor de cabeza.**
- **fiebre.**
- **náuseas.**
- **dolores musculares.**



VACUNA RUBEOLA

- **VACUNA RUBEOLA:** Es una infección vírica aguda y contagiosa, del genero Rubivirus de la fam togaviridae ARN. El virus es transmitido por vía respiratoria y se replican en la nasofaringe y en los nódulos linfáticos

VIA DE APLICACIÓN

- Vía subcutánea.

SITIO DE APLICACIÓN

- La vacuna se aplica mediante una inyección en el brazo.

DOSIS

- 0.5 ML

EDAD DE APLICACIÓN

- La primera a los doce meses de edad.
- La segunda se aplica a los 6 años de edad.



CONTRAINDICACION

- Se debe evitar recibirlas en el embarazo y se consultará con el médico si se tienen las defensas disminuidas por alguna enfermedad o si se recibe un tratamiento de fondo que las pueda debilitar.

INFORMACION

- Erupción cutánea.
- Fiebre poco intensa (<39 °C).
- Náuseas y conjuntivitis leve.
- El exantema, que se observa en el 50% al 80% de los casos, habitualmente comienza en la cara y el cuello.
- La inflamación de los ganglios linfáticos en la parte posterior de las orejas y el cuello.



VACUNA SARAMPIÓN

- El **sarampión** es causado por un virus que puede propagarse fácilmente por el aire cuando una persona infectada estornuda o tose, también se puede transmitir por contacto directo con secreciones de la nariz o la boca de una persona infectada.

VIA DE APLICACION

- Vía subcutánea.

SITIO DE APLICACIÓN

- En el muslo o el brazo, según la edad.

DOSIS

- 0,5 mL

EDAD DE APLICACIÓN

- Primera dosis: de los 12 a los 15 meses de edad.
- Segunda dosis: de los 4 a los 6 años de edad.

CONTRAINDICACION

- Una reacción alérgica anafiláctica a una dosis previa de una vacuna o a algún componente de la misma es una contraindicación permanente para volver a administrar dicha vacuna o cualquier otra vacuna que contenga dicho componente.

INFORMACION

Algunos de los síntomas más comunes del sarampión son:

- Fiebre alta (puede subir hasta más de 104 °F).
- Tos.
- Moqueo.
- Ojos enrojecidos y llorosos.
- Sarpullido (que aparece 3 a 5 días después de que empiezan los síntomas).



VACUNA PAROTIDITIS (SRP).

- ❖ **Es una enfermedad** contagiosa y se propaga fácilmente de una persona a otra. Puede generar complicaciones graves, como pérdida de audición, no son frecuentes, las infecciones todavía pueden ocurrir en los lugares donde las personas están en contacto cercano, como en las escuelas, universidades y campamentos.

VIA DE APLICACION

- **vía subcutánea**

SITIO DE APLICACIÓN

- **En el muslo o el brazo, según la edad.**

DOSIS

- **0,5 mL**

EDAD DE APLICACIÓN

- **Primera dosis: de los 12 a los 15 meses de edad.**
- **Segunda dosis: de los 4 a los 6 años de edad.**


CONTRAINDICACION

- **Si se ha tenido una reacción alérgica grave con una dosis anterior o con algún componente vacunal (como la gelatina o los antibióticos que a veces contiene para evitar su contaminación).**

INFORMACION

Síntomas que te pueden dar:

- **Dolor, enrojecimiento o hinchazón en el lugar de la inyección.**
- **Fiebre.**
- **Sarpullido leve.**
- **Dolor y rigidez pasajeros en las articulaciones.**



VACUNA SABIN.

La vacuna Sabin contra la Poliomiélitis está compuesta de virus vivos atenuados (debilitados), contiene los antígenos de los virus tipo I, II y III de la poliomiélitis, por ello es trivalente; también contiene un estabilizador.

VIA DE APLICACION

- Vía oral.

SITIO DE APLICACIÓN

- En la boca.

DOSIS

- 2 gotas= 0.5 ML

EDAD DE APLICACIÓN

- Se aplica a niñas o niños de 6 meses hasta 5 años de edad.

CONTRAINDICACION

- Si hay antecedente de un evento grave o reacción alérgica a dosis previas.
- Enfermedad aguda con temperatura mayor a 38.5°C.
- Tener inmunodeficiencia congénita (problemas de defensas desde el nacimiento) o padecer SIDA (Síndrome de Inmunodeficiencia Adquirida).
- Encontrarse en tratamiento con medicamentos que disminuyan las defensas del cuerpo (el sistema inmune), como los cortico esteroides, radioterapia o quimioterapia.
- Padecer cualquier tipo de cáncer maligno.

INFORMACION

- Dolor de cabeza
- Vómito
- Diarrea

