



 **UDS**

**UNIVERSIDAD DEL SURESTE**

**ELABORADO POR**

CLARA ELISA ENCINO VAZQUEZ

**MATERIA**

ANTROPOLOGIA MEDICA I

**TEMA**

SINDROMES DE FILIACION CULTURAL/CAIDA DE MOLLERA

**CATEDRATICO**

DRA. KATIA PAOLA MARTINEZ LOPEZ

**CAMPUS**

SAN CRISTOBAL DE LAS CASAS CHIAPAS

**LICENCIATURA EN MEDICINA HUMANA**

**1 SEMESTRE "A"**

03 DE ENERO DEL 2022

# La caída de mollera

## CAÍDA DE MOLLERA - HUNDIMIENTO EN EL CRÁNEO

Su nombre real no es "mollera" como se le dice coloquialmente si no "fontanela" que es aquella área de la cabeza del neonato donde los huesos del cráneo aún no se han cerrado o unido.

La fontanela más pequeña de la parte trasera de la cabeza suele cerrarse entre los dos y tres meses de edad. La fontanela más grande, en la frente, a menudo se cierra alrededor de los 18 meses.

## SINTOMATOLOGÍA

Diarrea frecuente, pérdida de apetito, cambio en el color de la piel, somnolencia, crecimiento lento o vomito

## TRATAMIENTO

Cuidados en el hogar como evitar caídas, aumentar la ingesta de líquidos o tratamiento hospitalario para recibir suero o una alimentación vía intravenosa.



## CAUSAS

Caída del niño, deshidratación o desnutrición

## INFORMACIÓN AL PACIENTE

El neonato (bebé) presenta deshidratación o presión craneal. Las fontanelas son las “partes blandas” que se ubican en la parte superior de la cabeza. Estos puntos blandos son espacios entre los huesos del cráneo que gracias a que no ha cerrado por completo, facilitan el paso del bebé por el canal de parto.

Es “normal y sano” que un bebé tenga fontanelas, las cuales se unirán y cerraran en cuestión de meses.

## MITO

La fontanela anterior (o mollera), ese hueco suave en la cabeza de los bebés, se puede “caer” por cargar mal a un niño o niña, o quitarle la mamila muy rápido mientras come, pero también se cree que sucede porque el niño o niña se golpeó la cabeza o le hicieron “mal de ojo”

