

Taller de Casos Clínicos

- 1. de 12 Derivaciones Electrocardiograma, Biomarcadores de Necrosis, Pruebas de Imagen
 - Ecocardiograma
 - TAC
 - Radiografía
- 2. Tiempo transcurrido del Proceso en el que llega al Paciente y el Contacto medico 90-120 min
- 3. Tiempo para determinar el diagnostico de IAM, acompañado de ICP.
- 4. Elevación del Segmento ST en el Punto J con variaciones en Sexo diferencial es decir entre hombres y mujeres y la Edad del Paciente
- 5. Mioglobina Primera Enzima Cardíaca elevada para diagnostico de Infarto entre 3-7 hrs
- 6 Troponina
- 7 Podemos recurrir a una ICP con balón, colocación de Endoprotesis, Cirugía de revascularización cardíaca, Terapia fibrinolítica o Uso de Agentes Trombolíticos; Acido Acetil Salicílico dependiendo el estado del Paciente
- 8 150-300 mg
- 9 Intervención Coronaria Percutanea
- 10 Tirobifina, Abcixilina
- 11
- 12 Hipertensión Arterial Crónica con Preclampsia Sobrecargada
- 13 Alfa Metil dopa
- 14 Reducir de un 20-25% en la Primera Hora, con disminución Progresiva
- 15 ~~Ogen~~ Daño a Organos Blanco
- 16 Metoprolol
- 17 ~~f~~ Metoprolol
- 18 Losartan
- 19 Preclampsia
- 20 EGO - BH - OS - PFH - Pruebas de laboratorio
- 21 Ambulatio sin embargo es Necesario tenerla en Observacion con Pase directo a Urgencia.

22. Pruebas de Imagen, Clínicas, SDG 24-34, Marcadores Rítmicos
23. HELL: Emolisis, Enzimas Hepáticas Elevadas y Plaquetopenia
24. Mujer embarazada que convulsiona, Produciendo Contracción del músculo liso
Poniendo en riesgo la Vida del Producto
25. Alfa Metildopa
26. Cuando la Madre era Normotensa o no tenía Signos de Hipertensión y la desarrolla después de las 20 SDG
27. Defectos en la Placenta, Deficiencia Inmunológica, Problemas de la Madre
28.
29. Tonería bajo Vigilancia, hacer algún Vasodilatador.
30. Pericarditis Aguda
31. ~~de hipertensión~~ ~~Pericarditis~~ ~~Microorganismos Infecciosos~~, Obstrucción de la irrigación
Pericardica
32. Estadio III
33. Estadio I
34. ~~Calcemia~~ Analgésicos Opiáceos, Ibuprofeno (enfocado en tratar Síntomas).
calcemia Indometacina, Aspirina en dosis Alta
35. en la elevación del Segmento ST
 o Pericarditis
 - Concavo ST
 - Difusa
 o IAM
 Convexo ST
 - Marcado
- o 36. Pericarditis en un estadio III fase de Regularización
- o 37. Pericarditis o IAM
 - Sensación de Muerte
 - Dolor Irradiado a Cuello, Mandíbula, Brazo izquierdo
 - Dolor No Sesea con Medicamentos
- El Dolor se alivia con medicamento
 - Tipo Opresivo
 - No Irradiado
- o 38. Criterios de Duke

- 39 • 2 Criterios Mayores y 1 menor
- 1 Criterio Mayor y 3 menores
- 5 menores

• 40 • • • • •

• 41 Aortica → Mitral → Tricuspídea

• 42 • Ritmo de Galope en S3