UNIVERSIDAD DEL SURESTE

ALUMNO: FRETH HIRAM GUTIERREZ DIAZ



DOCENTE: DR LUSVIN IRVIN JUAREZ GUTIERREZ

PERICARDITIS AGUDA

GRADO: 5TO

GRUPO A

PERICARDITIS AGUDA

La pericarditis aguda es una inflamación del pericardio (el saco flexible con dos capas que envuelve el corazón) que comienza súbitamente, es dolorosa y causa que los fluidos y los componentes sanguíneos (como la fibrina, los glóbulos rojos y los glóbulos blancos) entren en la cavidad pericárdica.

Por lo general, la pericarditis aguda produce fiebre y un dolor torácico punzante que muchas veces se extiende hacia el hombro izquierdo y, en ocasiones, baja por el brazo izquierdo. Este dolor es similar al de un infarto de miocardio, pero suele empeorar cuando el paciente se acuesta, cuando deglute alimentos, cuando tose o incluso cuando respira profundamente. El líquido o la sangre que se acumulan en la cavidad pericárdica ejercen presión sobre el corazón e interfieren en su capacidad para bombear la sangre.

Causas

Infección (viral, bacteriana, parasitaria o fúngica y, en personas
con sida, tuberculosis o as pergilosis)

Infarto de miocardio

Cirugía cardíaca (síndrome de postpericardiotomía)

Lupus eritematoso sistémico (lupus)

Artritis reumatoide

Insuficiencia renal

Lesión torácica

Cáncer
(como leucemia, cáncer de mama o cáncer de pulmón, o, en personas con sida, sarcoma de Kaposi)

Fiebre reumática

Radioterapia

Medicamentos, como warfarina y heparina (anticoagulantes), penicilina, procainamida (un medicamento utilizado para tratar los ritmos cardíacos anormales) y fenitoína (un medicamento anticonvulsivo)

Desconocida (pericarditis idiopática o no específica)

Diagnóstico

- Electrocardiografía
- Radiografía de tórax
- Ecocardiografía

Tratamiento

- Fármacos antiinflamatorios, tales como fármacos antiinflamatorios no esteroideos o colchicina
- Tratamiento del trastorno subyacente, como por ejemplo el cáncer
- En raras ocasiones, tratamiento quirúrgico, como una pericardiotomía