

Marcos Moreno
9/11/2021

Taller de casos clínicos

- 1: Biomarcadores cardiacos, Electrocardiograma
- 2: Tiempo que transcurre al ingreso del paciente a la sala de urgencias
- 3: Tiempo que transcurre desde inicio de los síntomas del paciente hasta la atención.
- 4: Menciona la definición universal del ST (Síndrome coronario agudo)

5: Marcador cardiaco indicativo de un IAM en evolución

6: Tropomiosina /

7: (ICP), Terapia fibrinolítica,

8: 150-300mg de AAS. (162 - 325mg)

9: (ICP) (- Terapia antiplaquetaria)

10: Terapia fibrinolítica medicamentosa. (Eparina, enoxaparina)

11: Eventos cerebrovasculares previos, pacientes adultos mayores a 75 años, datos de aneurismas.

Hipertensión

12: Hipertensión crónica sobre agregada.

13: Alfametildopa (Hidralasina / Nifedipino

14: Disminución de la presión Arterial Media. (-70%)

15: En la urgencia el control es ambulatorio con indicaciones antihipertensivas y dieta. En la Emergencia hipertensión existe el daño a órgano blanco y requiere hospitalización.

16: Metoprolol

19: Pteclampsia

17: Furosemida

20: BH, Usg, Urea y Creatinina 24hrs.

18: Losartán.

15051111 P

- 21: Intra hospitalario (probable desprendimiento placentario, Muerte fetal) Parto pre termino
- 22: Ultrasonido y utilizacion de dopler, en caso de ser necesario iniciar la terapia de moduradores pulmonares dependiendo las semanas de gestacion.
- 23: Hemolisis, Enzimas hepaticas elevada, Plaquetopenia
- 24: Eclampsia es la complicacion de preeclampsia en donde existe el riesgo de convulsiones de la paciente embarazada y por ende un parto pre termino.
- 25: Salicilato (Magnesio)
- 26: Es la paciente embarazada con datos de aumento de la presion arterial antes de las 20 Sdg y sin presencia de proteinuria.
- 27: Defectos en la implantacion de la placenta
- 28: Alfametildopa, Nifedipino, Hidralacina.
- 29: Terapia de reposicion de liquidos con solucion fisiologica a 10hrs, Indicada.

- 30: ~~Endocarditis~~ Pericarditis
- 31: ~~Idiopatica~~ ~~Bacteriana~~ (Idiopatica)
- 32: III
- 33: I
- 34: AINES, Antibioticos, Beta-lactamicos, glicocorticoides y antiplaquetarios.
- 35: Marca ena elevacion concava en pericarditis y convexo en IAM

36: Se encuentra en IV estadio con Normalización de el electrocardiograma.

37: IAM Sensación de Muerte inminente, dolor precordial, irradiación a brazo izquierdo y mandíbula. Peneaditis, Dolor retroesternal, irradiación a trapecios ~~al~~ alivio del dolor al inclinarse hacia adelante

38:

39: 2 Mayores y 1 menor o 5 menores y 1 Mayor

40:

41: Mitral

42: Ala auscultar se encuentra el "roce"