



**UNIVERSIDAD DEL SURESTE.**

**LICENCIATURA EN MEDICINA HUMANA.**

**3ER. SEMESTRE.**

**2DA. UNIDAD.**

MATERIA:

SEXUALIDAD HUMANA.

DOCENTE:

DRA. MARTINEZ LOPEZ KATIA LOPEZ.

ALUMNO:

HERNANDEZ URBINA ANTONIO RAMON.

FECHA:

JUEVES, 07 DE OCTUBRE DE 2021.

## **INFECCIONES DE TRANSMISION SEXUAL.**

Las infecciones de transmisión sexual (ITS), también conocidas como enfermedades de transmisión sexual (ETS) son un conjunto de estados infectocontagiosos agrupados por tener en común la misma vía de transmisión; de persona a persona por medio de contacto íntimo durante las relaciones sexuales.

Las vías de transmisión se clasifican en tres:

- Transmisión sexual: coital, anal u oral.
- Transmisión sanguínea.
- Transmisión perinatal.

Los agentes productores de las ITS incluyen:

- Bacterias.
- Hongos.
- Protozoos.

Las ITS o ETS tiene tres tipos de clasificaciones:

- 1- Virales:
  - Condiloma.
  - Hepatitis C.
  - Herpes.
  - Molusco contagioso.
  - VIH-Sida.
- 2- Bacterianas:
  - Gonorrea.
  - Sífilis.
  - Clamidia.
- 3- Parasitarias:
  - Tricomoniasis.
  - Ladillas.
  - Sarna.

### **INFECCIONES VIRALES:**

#### **CONDILOMA (VERRUGAS GENITALES):**

- Es conocido como virus del papiloma humano (VHP).
- Se desarrollan en los genitales de 1-3 meses después del contagio.
- En las mujeres pueden causar cáncer cervical.

Tipos:

- Condilomas acuminados (excrecencias de color piel con una superficie semejante a una coliflor).
- Verrugas planas que varían de tamaño.

Síntomas:

En la fase de formación:

- Picores y escozor que pueden producir pequeñas hemorragias.
- Irritación en los labios vaginales y la piel de la zona infectada.

### **HERPES:**

- Virus Herpes simple tipo 2 (VHS-2).
- Ampollas y granos dolorosos en la piel y las membranas genitales.

Síntomas:

- Inicialmente, sensación de calor, picor y aparición de color rosado.
- Pequeñas ampollas que se unen para formar una ampolla larga.
- Ampolla y granos dolorosos llenos de fluido.
- Costras amarillas al principio de la fase de curación.
- Fiebre leve.
- Bultos en la ingle.

### **SIDA:**

- El virus afecta progresivamente células fundamentales del sistema inmunológico.
- SIDA: conjunto de signos y síntomas que aparecen como consecuencia del debilitamiento y afección del sistema inmunológico.
- El SIDA representa la última etapa clínica de la infección por el VIH.

Síntomas:

Cuando la persona empieza a sentirse mal y tener síntomas, ya se le considera enferma de sida.

Al principio de la enfermedad, las manifestaciones que aparecen y duran más de un mes:

- Fiebre.
- Sudores nocturnos.
- Diarrea.
- Pérdida rápida de peso.
- Cansancio.
- Ganglios inflamados.
- Erupciones en la piel.
- Pulmonía.

- Tos.

## **INFECCIONES BACTERIANAS:**

### **GONORREA:**

- Bacteria (*Neisseria gonorrhoeae*).
- Afecta el cuello del útero, al recto, a la faringe y a los ojos.

Se caracteriza por:

- Exudado purulento de color amarillo verdoso mediante la uretra.
- Inflamación de los órganos genitales.
- No es necesario que haya eyaculación para contraer.
- Puede transmitirse de madre a hijo durante el parto.

Síntomas y complicaciones:

Hombres:

- Dolor al orinar con sensación quemante.
- Supuración del pene.

Mujeres:

- Ardor al orinar.
- Alteraciones en el ciclo menstrual.
- Exudado e irritación en la mucosa vaginal.

Ambos:

- Cuando infecta la boca y la garganta: dolor para tragar, irritación, malestar general.

### **SIFILIS:**

- Bacteria *Treponema Pallidum*.
- La bacteria, es capaz de atravesar la placenta y transmitirla al feto (sífilis congénita).
- Aparecen lesiones en los órganos genitales e inflamación que exuda material altamente contagioso.

Síntomas:

Sífilis primaria:

- Chancro.
- Ulceración no dolorosa, endurecida, sin supuración.
- En genitales, perianales, intravaginales u orales.

Sífilis secundaria:

- Rash generalizado papuloescamoso, no prurítico.
- Incluye las palmas de las manos y las plantas de los pies.

### **CLAMIDIA (CERVICITIS):**

- Bacteria Chlamydia trachomatis.
- Afecta los órganos genitales de la mujer causando inflamación del cuello uterino.
- Esta infección también puede causar secreción del pene en un hombre infectado.

Transmisión:

- Relaciones sexuales vaginales, orales o anales.
- De madre a hijo durante el parto vaginal.

Síntomas (enfermedad silenciosa):

Hombres:

- Secreción del pene y una sensación de ardor al orinar.
- Ardor y picazón alrededor de la abertura del pene.
- El dolor y la inflamación de los testículos.

Mujeres.

- Flujo vaginal anormal o una sensación de ardor al orinar.
- Dolor en la parte inferior del vientre o de espalda.
- Náuseas y fiebre.

Ambos:

- Por relaciones sexuales anales: dolor, secreciones o sangrado en el recto.
- Por relaciones sexuales orales: puede presentarse en la garganta.

### **INFECCIONES PARASITARIAS:**

#### **TRICOMONIASIS:**

- Parasito Trichomonas vaginalis.
- Las mujeres tienen más probabilidades que los hombres de presentar algún síntoma.
- Las mujeres contraen la infección generalmente en la vagina.
- Los hombres contraen la infección generalmente en la uretra (canal urinario).

Síntomas:

Hombres:

- Una irritación o sensación de ardor dentro del pene.

- Una secreción del pene.

Mujeres:

- Un flujo vaginal anormal, con un fuerte olor.
- Molestias al orinar o al tener relaciones sexuales.
- Irritación o picazón alrededor de los genitales.

### **LADILLAS:**

- Son criaturas pequeñas de seis extremidades que infectan el área vellosa de la región púbica y ponen sus huevos allí.
- Estos piojos también se pueden encontrar en el vello axilar y en las cejas.

Síntomas:

- Picazón en un área cubierta de vello púbico (a menudo empeora en la noche).
- Reacción cutánea de color azul grisáceo.
- Ulceras (lesiones) en el área genital debido a picaduras y al rascado.
- Se pueden ver los huevos (liendres) o piojos en adultos.