



SEXUALIDAD HUMANA

“CUADRO DE ITS”

CATEDRATICO:

Dra. Katia Paola Martínez

alumna:

Andrea Citlali Maza López

ESPECIALIDAD:

MEDICINA HUMANA I

SEMESTRE:

TERCERO

OCTUBRE 2021

INFECCIÓN	TIPOS	LA PRODUCE	CARACTERISTICAS	PROFILAXIS	MEDICACIÓN
GONORREA	BACTERIANA	Nisseria gonorrhoeae	Produce secreciones peneanas o vaginales y aumentan la frecuencia y la urgencia de la necesidad de orinar. Se transmite por contacto sexual vaginal, oral o anal.	Usar condón al momento de mantener relaciones sexuales ya sean vaginales, anales y orales	ANTIBIOTICO
CANDIDIASIS	FUNGICA	Candida albicans	Candida albicans es un tipo común de hongo. Este a menudo se encuentra en pequeñas cantidades en la vagina, la boca, el tubo digestivo y en la piel. Cuando su cantidad aumenta en cuando aparece la infección.	Mantener el área íntima limpia y seca. No usar ropa apretada.	antimicótico imidazol
PEDICULOSIS	PARASITARIA	Pthirus pubis	Es una infección del vello púbico causada por los parásitos conocidos como ladillas. Causan comezón en la zona cubierta por el vello púbico.	Evite el contacto sexual o íntimo con personas que tienen piojos en el pubis hasta que hayan recibido tratamiento. Báñese o dúchese con frecuencia y	Limpieza minuciosa. Medicamentos con permetrina.

				mantenga la ropa de cama limpia	
VIH	VIRICA	Virus de la inmunodeficiencia humana	Se trata de un virus que destruye determinadas células del sistema inmunitario. Cuando el VIH daña el sistema inmunitario, es más fácil enfermarse de gravedad e incluso morir a causa de infecciones que el cuerpo normalmente podría combatir.	Hacerse la prueba del VIH Practicar conductas sexuales menos riesgosas. Hacerse la prueba y recibir tratamiento para enfermedades de transmisión sexual No inyectarse drogas	Terapia antirretroviral. Los inhibidores de la transcriptasa inversa no análogos de nucleósidos (ITINN) Los inhibidores de la transcriptasa inversa análogos de nucleósidos o nucleótidos (ITIN) Los inhibidores de la proteasa (IP) Los inhibidores de la integrasa Los inhibidores de entrada o fusión
HERPES G.	VIRICA	Virus del herpes simple 2	Este hace que se formen llagas o ampollas en o alrededor de los genitales.	usar protección, como preservativos, al tener relaciones sexuales evitar las relaciones sexuales mientras existan síntomas evitar los besos y el sexo oral cuando	medicamento antiviral, como Aciclovir, para evitar que el virus se multiplique

				<p>existe una llaga alrededor de la boca lavarse las manos cuidadosamente, en especial después de tocar el área afectada, durante un brote</p>	
HEPATITIS B	VIRICA	Virus de la hepatitis B	<p>Tener hepatitis B crónica aumenta el riesgo de contraer insuficiencia hepática, cáncer de hígado o cirrosis, enfermedad que causa cicatrices permanentes en el hígado.</p> <p>Los signos y síntomas suelen aparecer aproximadamente de uno a cuatro meses después de que se ha infectado.</p>	<p>No compartir agujas u otros dispositivos para las drogas</p> <p>Usar guantes si tiene que tocar la sangre de otra persona o abrir llagas.</p> <p>No compartir artículos personales.</p> <p>Usar un condón durante las relaciones sexuales.</p> <p>Aplicarse la vacuna</p>	medicamentos antivirales.
SIFILIS	BACTERIANA	Treponema pallidum	<p>La sífilis se caracteriza por la aparición de chancros en: los genitales externos, la</p>	<p>La sífilis se previene para la vía sexual con el uso del preservativo o</p>	<p>El más utilizado es la dosis única de bencilpenicilina benzatina.</p>

			vagina, el ano o el recto, los labios y la boca.	condón en todas las relaciones sexuales.	
VPH	VIRICA	Virus del papiloma humano	Muchas personas que lo contraen no desarrollan síntoma, sin embargo, se caracteriza por la formación de verrugas.	Aplicarse la vacuna. Usar condón en las relaciones sexuales.	No existe tratamiento contra el virus mismo.
MOLUSCO CONTAGIOSO	VIRICA	Virus de la familia de los poxvirus	Causan una pápula que luego se agranda formando un nódulo coloreado perlado con un carácter opalescente.	Uso del condón durante las relaciones sexuales.	Se pueden utilizar cremas tópicas en casa o procedimientos médicos como los curetajes, la crioterapia, la terapia fotodinámica o la inmunoterapia
CLAMIDIASIS	BACTERIA	Chlamydia trachomatis	Se caracteriza por presentar más síntomas en mujeres como lo son: Flujo vaginal anormal, que puede tener un fuerte olor Sensación de ardor al orinar Dolor durante las relaciones sexuales	Uso del condón durante las relaciones sexuales.	Antibióticos.