



**UNIVERSIDAD DEL SURESTE
LIC. EN MEDICINA HUMANA**

**TERSER SEMESTRE
SEGUNDO PARCIAL**

**SEXUALIDAD HUMANA
CUADRO COMPARATIVO**

DOCENTE:

Dra. Katia Paola Martínez

ALUMNA:

Angélica Montserrat Mendoza Santos

ETS	CLASIFICACIÓN	MANEJO	DESCRIPCIÓN
VIH/SIDA	<p>Las tres fases de infección por el VIH son</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) infección aguda 2) infección crónica 3) síndrome de inmunodeficiencia adquirida (SIDA) 	<p>Todas las personas diagnosticadas con VIH deben comenzar con la terapia antirretroviral, independientemente de la etapa de la infección o de las complicaciones. La terapia antirretroviral suele ser una combinación de tres o más medicamentos de varias clases de fármacos diferentes</p>	<p>El Virus de Inmunodeficiencia Humana (VIH) es el causante del Síndrome de Inmunodeficiencia Adquirida (SIDA). Este destruye determinadas células de tu sistema inmunitario, baja tus defensas y te vuelve vulnerable a todo tipo de enfermedades. Se estima que tarda 10 años en que una persona con VIH -y sin tratamiento- desarrolle el SIDA. Este puede contraerse a través de relaciones sexuales, membranas mucosas o heridas en la piel. Hasta el momento no ha encontrado una cura. Pero hay medicamentos capaces de mantener sanos durante más tiempo a quienes se han contagiado y evitar su propagación</p>
VPH	<p>Los siguientes 15 tipos de VPH se clasificaron de alto riesgo: 16, 18, 31, 33, 35, 39, 45, 51, 52, 56, 58, 59, 68, 73 y 82. Los tipos 26, 53 y 66 se clasificaron como de posible alto riesgo, y 12 tipos se clasificaron de bajo riesgo: 6, 11, 40, 42, 43, 44, 54, 61, 70, 72, 81 y CP6108</p>	<p>Tratamiento Ácido salicílico. Los tratamientos de venta libre que contienen ácido salicílico actúan eliminando poco a poco las capas de una verruga Imiquimod. Esta crema de venta bajo receta podría mejorar la capacidad del sistema inmunitario</p>	<p>Existen alrededor de 200 tipos de Virus del Papiloma Humano (VPH). Algunos pueden ser inofensivos y temporales. Sin embargo, otros pueden causar verrugas que deben ser tratadas al momento. Los VPH de alto riesgo están asociados a problemas cancerígenos. Actualmente existe una vacuna para</p>

		para combatir el VPH	prevenir la infección del Virus del Papiloma Humano (VPH), además se recomienda el uso de preservativo para no contraer este virus.
CLAMIDIA	Las clamidias que infectan a los seres humanos se dividen en tres especies, Chlamydia trachomatis, Chlamydia pneumoniae y Chlamydia psittaci con base en su composición antigénica, inclusiones intracelulares, sensibilidad a la sulfadiazina y tipo de enfermedad ocasionada	La clamidia se trata con antibióticos. El tratamiento antibiótico recomendado es la doxiciclina, dos dosis diarias durante siete días o la azitromicina en una única dosis. Se pueden utilizar otros medicamentos alternativos, pero no son tan eficaces como la azitromicina y la doxiciclina	Se encuentra entre las ETS más comunes, y quienes la padecen, por lo general, no presentan síntomas. ¿Sabes cómo se contagia la clamidia? La bacteria que la produce puede alojarse en el esperma o el líquido preseminal del hombre y en las secreciones vaginales. Saber cómo se contagia la clamidia te ayuda a mantenerte siempre alerta y tomar medidas. Esta puede tratarse con antibióticos, aunque, si no se hace a tiempo, puede generar graves problemas a largo plazo
GONORREA	No existe clasificación	Debido a las cepas emergentes de Neisseria gonorrhoeae resistente a los medicamentos, los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades recomiendan que la gonorrea no complicada se trate con el antibiótico ceftriaxona, administrado por inyección, con	Para el cierre de 2018, el Ministerio de Salud estimaba el registro de unos 3.000 casos. Esto debido a que a pesar de ser una ETS, puede ser contraída de distintas formas: a través de la boca, la garganta e incluso, los ojos. Ahora bien, ¿qué examen se hace para la gonorrea? En el caso de las mujeres, se puede tomar una muestra del cuello uterino; en los hombres, la muestra es

		azitromicina oral (Zithromax)	de la abertura de la uretra. Por otro lado, las pruebas de orina también sirven para detectar la enfermedad. Ahora que ya sabes qué examen se hace para la gonorrea, no hay excusa para que te lo realices si sospechas que puedes haberte contagiado
HERPES GENITAL	La familia herpesviridae se clasifica en tres subfamilias - alfa, beta y gama-, cada una con especies que infectan al hombre. Los alfa herpesvirus se caracterizan por crecer rápidamente y destruir a la célula hospedera, para después establecer infecciones latentes en ganglios sensoriales	Se pueden usar medicamentos para controlar los brotes. Medicamentos Antiviral	El herpes genital es una ETS causada por dos tipos de virus. Estos virus se llaman virus del herpes simple tipo 1 (VHS-1) y virus del herpes simple tipo 2 (VHS-2).
SIFILIS		El tratamiento preferido en todas las etapas es la penicilina, un medicamento antibiótico que puede matar al organismo que causa la sífilis. Si eres alérgico a la penicilina, tu médico puede sugerirte otro antibiótico o recomendarte la insensibilización con penicilina	La sífilis es una infección bacteriana que suele transmitirse por contacto sexual. La enfermedad comienza como una llaga indolora, por lo general en los genitales, el recto o la boca. La sífilis se transmite de persona a persona a través del contacto de la piel o de las membranas mucosas con estas llagas