



UNIVERSIDAD DEL SURESTE.

LICENCIATURA EN MEDICINA HUMANA.

3ER. SEMESTRE.

1ERA. UNIDAD.

MATERIA:

SEXUALIDAD HUMANA.

DOCENTE:

DRA. MARTINEZ LOPEZ KATIA PAOLA.

ALUMNO:

HERNANDEZ URBINA ANTONIO RAMON.

FECHA:

DOMINGO, 17 DE OCTUBRE DE 2021.

ENFERMEDADES DE TRANSMISION SEXUAL (ETS).

| | CLASIFICACION: | DESCRIPCION: | MANEJO/TRATAMIENTO: |
|--|-----------------------|--|--|
| HEPATITIS B. | Producidas por virus. | Infección grave del hígado causada por el virus de la hepatitis B que se puede prevenir fácilmente mediante una vacuna. Generalmente se transmite por la exposición a los fluidos corporales infectados. | <ul style="list-style-type: none"> - La afección suele desaparecer por si sola. - aplicación de vacunación contra la hepatitis B para prevención. - Usar condones de látex durante las relaciones sexuales. |
| HERPES GENITAL. | Producidas por virus. | Infección de transmisión sexual frecuente caracterizada por dolor y llagas en los genitales. La enfermedad es causada por el virus del herpes simple y puede afectar tanto a los hombres como a las mujeres. | <ul style="list-style-type: none"> - El tratamiento consiste en medicamentos antivirales y cuidado personal. - Usar condones de látex de manera correcta cada vez que se tenga relaciones sexuales. |
| CONDILOMA VIRAL (VIRUS DEL PAPILOMA HUMANO). | Producidas por virus. | Infección que provoca verrugas en varias partes del cuerpo, según la cepa. | <ul style="list-style-type: none"> - No hay cura para el virus y las verrugas pueden desaparecer por si solas. - Se recomienda aplicar una vacuna que evita las |

| | | | |
|-----------|-------------------------|---|--|
| | | Es una de las ETS más común. | cepas de VPH con mas probabilidades de causar verrugas genitales y cáncer cervical. |
| VIH/SIDA. | Producidas por virus. | El VIH ocasiona el SIDA y, además, interfiere con la capacidad del cuerpo de combatir infecciones. El virus se puede transmitir mediante el contacto con la sangre, el semen o los flujos vaginales infectados. | <ul style="list-style-type: none"> - No existe una cura para el SIDA, pero la observancia estricta de la terapia antirretroviral puede disminuir significativamente el progreso de la enfermedad y evitar infecciones y complicaciones secundarias. |
| SIFILIS. | Producida por bacteria. | Es una infección bacteriana, comienza con una llaga indolora. La sífilis se desarrolla por etapas y los síntomas pueden variar en cada una de ellas. | <ul style="list-style-type: none"> - El tratamiento consiste en penicilinas. - Las parejas sexuales también deben de recibir el tratamiento. |
| GONORREA. | Producida por bacteria. | Es una infección bacteriana de transmisión sexual que, si no se trata, puede ser causa de infertilidad. | <ul style="list-style-type: none"> - Se trata con antibióticos. - Usar condones de látex al momento de tener relaciones sexuales. |

| | | | |
|-------------------------------|--------------------------------|--|---|
| <p>CHLAMYDIA TRACHOMATIS.</p> | <p>Producida por bacteria.</p> | <p>La infección por clamidia es una ETS común que puede infectar tanto hombres como mujeres. Puede causar daños graves y permanentes en el aparato reproductor de una mujer y hacer más difícil o imposible un embarazo a futuro. Puede provocar embarazo ectópico.</p> | <ul style="list-style-type: none"> - Clorhidrato de tetraciclina 500 mg cada 6h 7 días. - Doxiciclina 100 mg cada 12 h mínimo 7 días. - Azitromicina 1g DU. - Tx en pareja. |
| <p>VAGINOSIS BACTERIANA.</p> | <p>Producida por bacteria.</p> | <p>Es un tipo de inflamación vaginal causada por el crecimiento excesivo de bacterias que se encuentran naturalmente en la vagina. Suele afectar a las mujeres en edad fértil. Algunas actividades como las relaciones sexuales sin protección o las duchas vaginales frecuentes, pueden aumentar el riesgo.</p> | <ul style="list-style-type: none"> - El tratamiento incluye la prescripción de cremas, geles o medicamentos. - Minimizar la irritación vaginal. - No darse duchas vaginales. |

| | | | |
|---|------------------------------|---|--|
| GRANULOMA VENEREO. | Producida por bacteria. | Es una ETS causa por Chlamydia trachomatis. Provoca dolor e hinchazón en los ganglios linfáticos de la ingle y, en algunos casos, infección en el recto. | <ul style="list-style-type: none"> - Uso habitual y correcto del preservativo. - Rápido diagnóstico y tratamiento de la infección. - Aplicación de antibióticos como: doxiciclina, eritromicina o tetramiclina. |
| CANDIDIASIS. | Producida por hongos. | Infección fúngica ocasionada por el hongo cándida que se presenta generalmente en la piel o las membranas mucosas. | <ul style="list-style-type: none"> - El tratamiento consiste en aplicar antimicóticos sobre el área afectada o administrar antimicóticos orales. - Es importante mantener la piel seca. |
| TRICHOMONAS VAGINALIS (TRICONIASIS UROGENITAL). | Producida por endoparásitos. | Es una infección frecuente transmitida sexualmente por un parásito. | <ul style="list-style-type: none"> - El tratamiento consiste en antibióticos en pareja. - No tener varias parejas sexuales. |
| ESCABIOSIS O SARNA. | Producida por ectoparásitos. | Enfermedad cutánea contagiosa que provoca mucha comezón ocasionada por un pequeño acaro arador. La sarna es contagiosa y se propaga rápidamente por el contacto físico. | <ul style="list-style-type: none"> - El tratamiento consiste en antiparasitarios. - |

| | | | |
|-----------------------------------|---------------------------------|---|--|
| PIOJO DEL PUBIS O LADILLAS. | Producida por ectoparásitos. | Son pequeños insectos que se encuentran en la región genital. | |
|-----------------------------------|---------------------------------|---|--|