

LICENCIATURA EN MEDICINA UDS

Nombre del docente: Natanael Ezri Prado

Nombre del alumno: Marvin Andrés Cano Hernández

Materia: Revisión de artículo

Grupo y Grado: 3ro A



¿CUAL ES LA IDEA CENTRAL DEL ARTICULO? SOBRE LAS REACCIONES ADVERSAS QUE LAS PERSONAS SUFREN A LOS EFECTOS FARMACOLOGICOS QUE SUELEN SER LAS REACCIONES ALERGICAS, COMO EN PRINSIPAL LAS PENISILINAS

¿CUAL ES EL OBJETIVO DEL ARTICULO? ESTUDIAR LAS DIFERENTES RACCIONES QUE PUEDE OCACIONAR LOS ANTIBIOTICOS, Y COMO ACTUAN EN DIFERENTES PERSONAS COMO TAMBIEN LA DESENSIBILIZACION QUE SE CONTRAE EN PACIENTES CON REACCIONES MEDIADAS O NO POR EL IgE

¿CUAL ES LA CONCLUSION DEL ARTICULO? LA INVESTIGACION Y EL ESTUDIO DE LOS ANTECEDENTES DE ALERGIA A LA PENICILINA COMO DE IGUAL FORMA LAS CEFALOSPORINAS DE PRIMERA Y SEGUNDA GENERACION PUEDEN CAUSAR MAS REACCIONES QUE LAS CEFALOSPORINAS DE TERCERA Y CUARTA GENERACION PERO MUCHAS DE ESAS REACCIONES SON EL RESULTADO DE UNA INFECCION VIRAL O BACTERIANA

¿COMO ES LA EVALUACION DE UN PACIENTE CON ALGUNA ALERGIA? ES CON UNA PRUEBA CUTANEA CON HIPERSENSIBILIDAD Y SE DEBE HACER POR UN ALERGOLOGO Y LA PRUEBA ES PUNCION CUTANEA INTRADERMICA CON EL DETERMINANTE PRINSIPAL PENICILOIL Y POLILISINA EL DETERMINANTE MENOR PENICILINA G, UN CONTROLHISTAMINICO y PRUEBAS DEBEN REALIZARSE EN AL MENOS 4 A 6 SEMANAS DESPUES DE LA REACCION.

¿CUALES SON LAS REACCIONES DE HIPERSENSIBILIDAD Y QUE CELULAS MEDIAN CADA UNA DE ELLAS? SUELE OCACIONAR UNA ERUPCION CUTANEA, EXANTEMA Y ANAFILAXIA TODAS COMPARTEN UNA ESTRUCTURA DE ANILLO CENTRAL COMUN DE BETALACTAMICOS Y TIAZOLIDINA.

¿CUALES SON LAS PRINCIPALES PREGUNTAS A REALIZAR EN UN PACIENTE CON HISTORIA DE ALERGIA A LA PENICILINA? ¿RECUERDAS LOS DETALLES DE LA REACCION?, ¿CUAL FUE LA INDICACION DE LA PENICILINA?, ¿HA TOLERADO OTRAS FORMAS DE OENICILINA DESDE LA REACCION? ¿ COMO MANEJO LA REACCION? Y ¿HACE CUANTOS AÑOS OCURRIO LA REACCION?

¿CUALES SON LOS PRINCIPALES METODOS DIAGNOSTICOS PARA UNA ALERGIA A LA PENICILINA Y EN QUE CONSISTEN CADA UNO DE ELLOS? PRUEBAS CUTANEAS,

CONSISTE EN PRUEBA DE PUNCIÓN CUTÁNEA E INTRADERMICA CON EL DETERMINANTE PRINCIPAL (PENICILOIL, POLILISINA) EL DETERMINANTE MENOR (PENICILINA G) UN CONTROL NEGATIVO (SOLUCIÓN SALINA NORMAL) Y UN POSITIVO CONTROL (HISTAMINA).