



Medicina Humana

Nombre del alumno: Luz Angeles Jiménez
Chamec

Nombre del profesor: Dr. Natanael Ezri Prado
Hernández

Nombre del trabajo: Revisión de artículo

PASIÓN POR EDUCAR

Materia: Farmacología

Grado y grupo: 3° B

ARTICULO "PENICILLIN ALLERGY, A PRACTICAL GUIDE FOR CLINICIANS"

1. ¿CUAL ES LA IDEA CENTRAL DEL ARTICULO? R= ES LA PENICILINA YA QUE ES EL FARMACO CON MAS FRECUENCIA ALERGICA.
2. ¿CUAL ES EL OBJETIVO DEL ARTICULO? R= ES QUE LOS PACIENTES QUE SON ALERGICOS A LA PENICILINA PUEDEN RECIBIR PENICILINA O ALGUN ANTIBIOTICO CON PENICILINA DESPUES DE UNA EVALUACION O UN POSIBLE TRATAMIENTO.
3. ¿CUAL ES LA CONCLUSION DEL ARTICULO? R= LA PREVALENCIA DE ALERGIA A LA PENICILINA ES DE 10% EN GENERAL, Y EL 90% NO SON ALERGICOS A LA PENICILINA DESPUES DE LAS PRUEBAS CUTANEAS. EN PACIENTES CON ALERGIA A LA PENICILINA, LA FRECUENCIA DE RESULTADOS POSITIVOS EN LAS PRUEBAS CUTANEAS DISMINUYEN EN UN AÑO DE EVITACION.
4. ¿COMO ES LA EVALUACION DE UN PACIENTE CON ALGUNA ALERGIA? R= FACTORES DE RIESGO DE ALERGIA Y FISIOPATOLOGIA DE LA ALERGIA DE LA PENICILINA, CLASIFICACION DE LAS REACCIONES DEL MEDICAMENTO Y SUS REACCIONES ADVERSAS.
5. ¿CUALES SON LAS REACCIONES DE HIPERSENSIBILIDAD Y QUE CELULAS MEDIAN CADA UNA DE ELLAS? R= INCLUYEN CURSOS FRECUENTES O REPETITIVOS DE PENITENCIA CILLIN Y DOSIS ALTA PATRENTAL EN LUGAR DE LA ADMINISTRACION ORAL.
6. ¿CUALES SON LAS PRINCIPALES PREGUNTAS A REALIZAR EN UN PACIENTE CON HISTORIA DE ALERGIA A LA PENICILINA? R= ¿RECUERDAS LOS DETALLES DE LA REACCION? ¿HACDE CUANTOS AÑOS OCURRIO LA REACCION? ¿COMO SE MANEJO LA REACCION? ¿CUAL FUE EL RESULTADO? ¿CUAL FUE LA INDICACION DE LA PENICILINA? ¿POR QUE LE DIERON PENICILINA? ¿HA TOLERADO OTRAS FORMAS DE PENICILINA DESDE LA REACCION?
7. ¿CUALES SON LOS PRINCIPALES METODOS DIAGNOSTICOS PARA UNA ALERGIA A LA PENICILINA Y EN QUE CONSISTEN CADA UNO DE ELLOS? R= PRUEBAS COMERCIALES INVITRO: SU ACTIVIDAD A LA PENICILINA ES INFERIOR A LAS PRUEBAS CUTANEAS, EN TERMINOS EL VALOR PREDICTIVO NEGATIVO Y NO ES UN SUSTITUTO ADECUADO PARA LA PIEL CON PENICILINA PRUEBAS.

PRUEBAS CUTANEAS: CONSISTE EN PRUEBA DE PUNCION CUTANEA E INTRADERMICA CON EL DETERIANTE PRINCIPAL (PENICILOL-POLILISINA) EL DETERMINANTE MENOR (PENICILINA G), UN NEGATIVO CONTROL TIVO (SOLUCION SALINA NORMAL), Y UN POSITIVO CONTROL (HISTAMINA).