

# Medicina forense

HERIDAS

GERARDO CANCINO GORDILLO

JENNIFER LARISSA LÓPEZ SANCHEZ

5 A



Paciente masculino de 35 años de edad, presenta herida en la cara a la altura del nervio mandibular del lado izquierdo de la cara, por arma corta de fuego, el disparo se realizo a boca jarro, siendo una herida penetrante, presentando el halo de fish, con quemadura mixta.



Paciente de 34 años, sexo masculino, presenta herida contusa, presentando bordes irregulares, por arma blanca en región inferior izquierda de la cara. Herida lineal en región izquierda de la cara que se extiende desde el pabellón auricular izquierdo hasta la región labial inferior izquierda e involucra la piel, tejido celular subcutáneo, musculo y mucosa, afectando al musculo masetero, arteria y vena facial,

# Heridas por arma de fuego por distancia

- ▶ Tocante o a boca jarro: es una herida fuerte, de Angulo complejo, con quemadura y presión en la piel, distancia de 0-1 cm
- ▶ Distancia corta o a quema ropa: deja tatuaje, ahumamiento, quemadura, material del cañón en manos y ropa, distancia de 1-12 cm
- ▶ Distancia intermedia: halo de fish, tatuaje, distancia de 13-70 cm
- ▶ Larga distancia: los signos son de confusión, no se distingue la distancia, distancia mayor de 70 cm