



MEDICINA HUMANA

MATERIA: MEDICINA FISICA Y DE
REHABILITACION

SEGUNDA UNIDAD

ENSAYO

CATEDRATICO:

DR. SERGIO RUIZ JIMENEZ

ALUMNO:
ABRAHAM NEFTALI PEREZ GUILLEN

GRUPO: 5 "A"

Afección de Plexo Braquial Y Lombosacro

Harrison menciona de diversas afecciones ocasionadas en el sistema Nervioso Central En el cual se muestra las raíces nerviosas entrelazadas entre sí. Por esta manera el Patrón Sintomático no se ajusta a las distribuciones de las raíces nerviosas.

En Pacientes adultos suele ser por un traumatismo por medio de caídas o compresión en el Neckitis braquial a su vez este tipo de síndrome es más común en el sexo masculino y se da principalmente en el periodo de lactante.

Las Partes afectadas del cuerpo van a depender del Plexo dañado: Plexo braquial rostral: hombros, Plexo braquial caudal: → Son: PLEX braquial rostral - caudal: manos y brazos; Plexo lumbar: piernas, Plexo sacro: Pélvis y Anus. Siendo así los trastornos de los Plexos se deben a la compresión física a una lesión; En lactantes normalmente es debido mayormente es debido por tracción debido a el parto.

La causa principal a un no es reconocido pero la teoría más aceptada en la actualidad es que se debe a un proceso inflamatorio de tipo inmunitario o de tipo viral.

Manifestaciones características de las Plexopatías con dolor en las membranas y déficit motoras y en los tipos sensitivos que no limitan a distribución de una raíz nerviosa aislado a un nervio periférico.


Neuritis braquial aguda y conlleva al dolor supraclavicular, etc tipo intenso con debilidad y disminución de los reflejos con alteraciones sensitivas leves que siguen la distribución del Plexo braquial y esto suelen aparecerse primero el dolor de 3 a 10 días aparece la debilidad.

Los músculos afectados más a menudo son el codo anterior.

No se reconoce su causa, pero se piensa que es debido a una inflamación.

Otros músculos inervados por el nervio interosseo anterior, es posible que los pacientes no puedan usar o con los dedos índice y el dedo medio.

En la parte del diagnóstico oportuno o tardío se recomienda una electromiografía y estudios de la conducción nerviosa, por lo general RM o TC del Plexo aproximando con esto el diagnóstico de un



BIBLIOGRAFIAS

- Health, N.I (2020). neuropatía periférica, U.S DEPARTMENT OF HEALTH, 1-32.
- RGS, U.d (2018). 14 ENFERMEDADES DEL SISTEMA NERVIOSO. RGS, 1-22

