



Universidad del Sureste

Licenciatura en Medicina Humana

Nombre de la alumna: Victoria Belén de la Cruz Escobar

Nombre del profesor: Dra. Karina Romero Solorzano

Nombre del trabajo: Tabla Diagnostica Diferencial "CAD y HHS"

Materia: Medicina Interna I

Grado: 5°

Grupo: "A"

Comitán de Domínguez, Chiapas a 22 de septiembre del 2021

Diagnóstico

DIFERENCIAL

Parámetros	Cetoacidosis Diabética	Estado Hiperosmolar
pH	< 7.35	> 7.35
Edad	Jóvenes	Mayores
Presentación	Aguda: Horas a días	Crónica: de días a semanas
Niveles de Insulina	Muy bajos	Pueden ser normales
Deshidratación	Moderada-Severa	Profunda
Cetoacidosis	Profunda	Mínimo o moderada
Coma	Raro	Común
más frecuente en	DM tipo 1	DM tipo 2
Problema preexistente	Hipovolemia	Acidosis
Consciencia	Suele estar alterada	Suele estar normal.
Osmolalidad	Suele estar normal	Elevada > 320 mOsm/kg
Síntomas	Polidipsia Poliuria Debilidad Pérdida de Peso Nauseas, Vomito	Polidipsia Poliuria Debilidad Pérdida de peso
Signos	Hipotermia, Taquicardia Taquipnea, Respiración Kussmaul, Hiperventilación, Aliento Cetónico, Dolor Abdominal.	Hipotermia, Hipotensión, Taquicardia, Signos neurológicos focales