

UNIVERSIDAD DEL SURESTE ESCUELA DE MEDICINA

MATERIA:

Medicina Interna

CATEDRÁTICO:

Dr. Karina Romero Solorsano

PRESENTA:

Éstefany Berenice García Ángeles

TRABAJO:

INVESTIGACION

GRADO Y GRUPO:

5 ° B

LUGAR Y FECHA:

COMITÁN DE DOMÍNGUEZ, CHIAPAS. 29 DE OCTUBRE DEL 2021

Clasificación de rife de falla renal aguda

	Tasa de filtración glomerular	Fujo urinario
R (RISK)	Aumento de la Cr sérica en 1.5 veces o disminución de la GFR >25%	<5ml/kg/h en 6 horas
I (INJURY)	Aumento de la Cr sérica en 2 veces o disminución de la GFR 75% Cr sérica >4 mg/dl	<5ml/kg/h en 12 horas
F (FAILURE)	Aumento de la Cr sérica en 3 veces o disminución de la GFR 75% Cr sérica >9 mg/dl	<3ml/kg/h en 24 horas o anuria en 12 horas
L (LOSS)	IRA persistente: Pérdida completa de la función renal >9 semanas	
E (END-STAGE)	Enfermedad Renal estado terminal. Necesidad de diálisis >3 Semes	

KDIGO 2012

Filtrado glomerular

Categorías, descripción y rangos (ml/min/1.73m²)

		Albuminuria		
		Categorías, descripción y rangos		
		A1	A2	A3
		Normal o ligeramente elevada	Moderadamente elevada	Gravemente elevada
G1	Normal o elevado	< 30 mg/g ³	30 - 300 mg/g ³	> 300 mg/g ³
G2	Ligeramente disminuido			
G3a	Ligeramente a moderadamente disminuido			
G3b	Moderada a gravemente disminuido			
G4	Gravemente disminuido			
G5	Fallo renal			

Escala "CURB-65"

El CURB-65 es una escala de predicción de severidad mortalidad utilizada en pacientes con neumonía adquirida en la comunidad.

C	Confusión	+ 1 punto
U	BUN > 19 mg/dL	+ 1 punto
R	Respiración > 30 rpm	+ 1 punto
B	PAS < 90 o PAS < 60 mmHg	+ 1 punto
65	Edad > 65 años	+ 1 punto

Interpretación

- 0-1 punto: Mortalidad de 0,2 a 2,7%, con siderar manejo ambulatorio
- 2-4 puntos: Mortalidad del 6,8 a 27%, considerar hospitalización
- 5 puntos: Mortalidad del 57%, considerar ingreso a UCI.

CLASIFICACIÓN SHOCK HIPOVOLEMICO

	1	2	3	4
Perdida de sangre	< 15%	15-30%	30-40%	> 40%
FC (LPM)	≤ 100	100 - 120	> 120	> 140
TAC (mmHG)	Normal	Normal	Hipotensión	Hipotensión severa
Presión pulso	Normal	Debil	muy debil	Casi ausente
Relleno capilar (seg)	Normal	72	72	72 o ausente
FR (RPM)	14-20	20-30	30-40	> 40
Diuresis (ML/H)	≥ 30	20-30	5-10	Anuria
Nivel de consciencia	Intranquilo	Ansioso	Confuso	Estuporoso
Gasto cardiaco	Normal	En descanso	Bajo	Muy bajo
Reposición de volumen	Cristaloïdes + coloides	Cristaloïdes + coloides	Cristaloïdes + coloides + sangre	cristaloïdes + coloides + sangre

"Signos de meningitis"

- * Vómito
- * Fiebre
- * Cefalea
- * Confusión
- * Foto sensibilidad
- * Rigidez en nuca
- * Manchas
- * Convulsiones
- * Dolor muscular
- * Manos y pies fríos
- * Somnolencia
- * Temblores
- * Signo de Kerning
- * Signo de Brudzinski
- * Irritabilidad
- * Alteración del estado mental.

"Tríada de Cushing" - Hipertensión Intracraneal =

- Hipertensión
- Alteraciones en la respiración.
- Bradicardia