



# **Universidad del Sureste**

## **Escuela de Medicina**

**“ESQUEMAS”**

---

**MEDICINA INTERNA**

**DR:**  
**KARINA ROMERO SOLORZANO**


**PRESENTA:**  
**Andrea Montserrat Sánchez López**

**MEDICINA HUMANA**

**5° SEMESTRE**

**OCTUBRE de 2021**  
**Comitán de Domínguez, Chiapas**

# ANEMIAS



### Clasificación de rife para falla renal aguda

	Criterio de FG	Criterio de volumen de diuresis
Riesgo (Risk)	Incremento de Crs $> 1.5$ sobre basal y/o reducción de FG 25%	$< 0.5$ ml/Kg/h en 6 horas
Dano	Incremento de Crs $> 2$ sobre basal y/o reducción de FG 50%	$< 0.5$ ml/Kg/h en 12 horas
Fallo	Incremento de Crs $> 3$ sobre basal y/o reducción de FG 75%	$< 0.3$ ml/Kg/h en 24 horas o anuria 12 horas
Perdida	Necesidad de TDE $> 4$ semanas	
Enfermedad renal terminal	Necesidad de TDE $> 3$ meses.	

### Clasificación de KDIGO para Falla renal crónica

Filtrado glomerular		Albuminuria		
		Categorías, descripción, rangos		
Categorías, descripción y rangos	(ml/min/1.73 m <sup>2</sup> )	A 1	A 2	A 3
		Normal o ligeramente elevada	Moderadamente elevada	Gravemente elevada
G1	Normal o elevado	$> 90$		Derivar
G2	Ligeramente disminuido	60-89		Derivar
G3a	Ligera o moderada m. disminuido	45-59	Monitorizar	Derivar
G3b	Moderada a gravemente dism.	30-44	Monitorizar	Derivar
G4	Gravemente disminuido	15-29	Derivar	Derivar
G5	Fallo renal	$< 15$	Derivar	Derivar

## ESCALA CURB 65

\* Índice de severidad de la neumonía

		Puntuación
C	Confusión	1
U	Urea > 19 mg/dl 7 mmol/l	1
R	FR > 30 rpm	1
B	TA < 90/60	1
65	Edad > 65 años	1

### Interpretación

0-1	puntos	Tratamiento ambulatorio
2	puntos	Ingreso hospitalario
3-5	puntos	Ingreso en UCI

# Clasificación de Choque Hipovolemico

	Grados			
	1	2	3	4
Perdida de sangre (ml)	750	750-1,500	1500,-2000	> 2000
▶ Perdida de sangre (%)	15%	15-30%	30-40%	>40%
▶ Pulso	100	100	120	140 ↑
▶ Presión Ar.	120/70 Nor.	120/70 nor.	90/50 ds	85/45 ↓
▶ Presión diferencial	Normal aumentada	Disminuida	Disminuida	Disminuida
▶ Respiraciones	14-20 rpm	20-30 rpm	30-40 rpm	35 rpm
▶ Prueba de rel. capilar	Normal	+	+	+
▶ Diuresis	30 ml/h	20-30 ml/h	5-10 ml/h	Insignificante
▶ SNC Estado mental	ligeramente ansioso	levemente ansioso	Ansioso, confundido	Confuso, letargico
▶ Reemplazo de líquidos	Cristaloide	Cristaloide	Cristaloide + sangre	Cristaloide + sangre.

# Signos meningeos

DÍA MES AÑO

- 1 Rigidez en la nuca  
Elevación de la cabeza y tronco en un mismo bloque
- 2 Signo de Brudzinsky  
Elevamos la cabeza, el paciente flexiona las rodillas de forma refleja
- 3 Signo de Kerning  
Elevamos la pierna extendida y el paciente flexiona la rodilla

## TRIADA DE CUSHING

Hipertensión Intracraneal

