



Universidad del Sureste
Escuela de Medicina



MAPAS

Alumno: Jesús Alejandro Morales Pérez

Docente: Dr. Nathanael Erizi Prado Hernández

Materia: Clínicas Medicas Complementarias

Semestre: 7° A

TVP/TP

Formación de trombos en las venas del sistema profundo con oclusión total o parcial de la luz.

Clinica

- Tumefacción
- Dolor
- Cianosis o palidez
- Edema

Diagnostico

- Criterios de Wells
- Ecografía Doppler
- Dímero-D

FACTORES DE RIESGO

- Inmovilización
- Cirugías
- Obesidad
- Hormonal
- Ingreso hospitalario
- oclusión total o parcial de la luz.

Tratamiento

- Movilización precoz
- Elevación de piernas
- Medias elásticas de compresión
- ANTICOAGULACIÓN
- Heparina no fraccionada
- Heparina BPM
- Warfarina

Clinica

- Disnea no explicada
- Sincope
- Hipotensión
- Cianosis

Diagnostico

- TAC de tórax
- Angiografía pulmonar

3 a 6 meses

INSUFICIENCIA CARDIACA

Síndrome que se caracteriza por síntomas típicos como la disnea y fatiga asociados a signos como presión venosa yugular elevada, estertores crepitantes pulmonares y edemas periféricos,

Diagnostico

- EKG
- RX TORAX
- RM
- ECOCARDIOGRAMA

Manifestaciones Clínicas

Izquierda

- Congestión pulmonar
- Disnea paroxística nocturna
- Edema agudo de pulmon
- Ortopnea

Derecha

- Ascitis
- Hepatomegalia
- Edema periferico con fovea
- Derrame pleural
- Acumulación de sangre en las venas sistemicas

Tratamiento

IC crónica deprimida

- Sacubitril/ Valsartan
- Dapaglifozina
- Metropolol
- Espironolactona

IC crónica

- Diuréticos
- Disminución en el consumo de sal
- Ejercicio

ICA

- Morfina
- Oxígeno
- Vasodilatadores
- Inotrópicos
- Diuréticos
- A-sentarse