

**NOMBRE DE ALUMNO: CRISTAL RUIZ
GÓMEZ**

**NOMBRE DEL PROFESOR: LUCIA
GUADALUPE GONZALEZ SANTIAGO**

**NOMBRE DEL TRABAJO:
SUPERNOTA**

MATERIA: FARMACOLOGIA II

GRADO: 4

GRUPO: A

LAXANTES

1 METAMUCIL

Este medicamento actúa aumentando el volumen de las heces, favoreciendo el tránsito intestinal. Metamucil está indicado en el alivio sintomático del estreñimiento, facilitando la evacuación de las heces, por ejemplo en caso de hemorroides.

Dosis:

Se ofrece en cucharadas, de una a cinco cada día.



2 PICOSULFATO DE SODIO

Anara es un laxante estimulante de acción local que sirve para el alivio del estreñimiento ocasional y para facilitar la evacuación en casos de hemorroides y fisuras anales.

Dosis:

via oral, en tabletas es de 1 a 2 unidades cada 24 horas en una sola toma.



3 OLEO-LAX

Es un producto en gel, con ingredientes naturales para lubricar y facilitar la expulsión del contenido intestinal. Remueve las obstrucciones causadas por el mal funcionamiento gastroentérico.

Dosis

Debido a la ingestión de pelo en perros y gatos: 3 a 5 g por 2 a 3 días.

Tratamiento laxante: 7.5 g por 2 a 3 días. Tratamiento como laxante ligero o preventivo: 2.5 ml por 2 a 3 días. O a criterio del médico veterinario.



4 LAXA PET

Indicado como laxante y lubricante para el tratamiento y prevención de la constipación o colitis provocada por obstrucción del tracto gastrointestinal con bolas de pelo en felinos.

Dosis:

felinos: constipación y colitis causada po ingestión de pelo: 3-5 ml (1 cda. cafetera) por 2-3 días.

Tratamiento laxante: 7.5 ml (1 1/2 cucharadas) al día, por 2-3 días. tratamiento como laxante ligero o preventivo: 2.5 ml (1/2 cda.) al día, por 2-3 días. 1 ml es equivalente a 1 gr.

