- Nombre de alumno: Juan Jose Garcia Pasquett
- Nombre del profesor:
- Nombre del trabajo: Mapa concepual
- Materia: Farmacología 2
- Grado:

Comitán de Domínguez Chiapas a 25 de septiembre de 2021

Antihistaminicos

Antihistamínicos primera generacion

Son fármacos que penetran bien en el SNC y son poco selectivos en sus acciones.

Causan diversos efectos indeseables como sedación, somnolencia, aumento del apetito y efectos anticolinérgicos

(sequedad de boca, visión borrosa, estreñimiento y/o retención de orina)

Se divide: Alquilaminas, etanolaminas, etilendiaminas, fenotiacinas, piperacionas, piperidinas-

Antihistanimicos no sedantes, 2da generacion

Actúan más selectivamente sobre los receptores H1 y penetran menos en el SNC

Caracteristicas

Sus características farmacológicas permiten en la mayor parte de los casos su uso en dosis única diaria.

Bilastina, cetirizina, desloratadina, ebastina, fexofenadina, levocetirizina, loratadina, mizolastina y rupatadina

Via topica

En colirios y/o aerosoles nasales, como azelastina, emedastina, epinastina, levocabastina u olopatadina.

Antihistamínicos H2

Bloqueadores H2

Son medicamentos que funcionan al reducir la cantidad de ácido gástrico secretado por glándulas en el revestimiento del estómago.

Se usan bloqueadores h2

Aliviar los síntomas de reflujo de ácido, o enfermedad del reflujo gastroesofágico (ERGE). Se trata de una afección en la cual el alimento