



Nombre del alumno:

Ángel Diego Rodríguez Guillen

Nombre del profesor:

Lucia Guadalupe Gonzales

Nombre del trabajo:

Súper nota

Materia:

Farmacología 2

Grado: "4"

Grupo: "A"

Comitán de Domínguez Chiapas a 14 de octubre de 2021.

Diuréticos

UROLIX: este medicamento esta indicado en el tratamiento de edemas en bovinos, equinos, porcinos, caninos y felinos. Para reducir los edemas producidos por afecciones renales, hepáticas, cardiacas o por quemaduras. Para estimular la diuresis. Para aumentar la excreción de iones de sodio, potasio y cloro. Para producir la diuresis forzada en el tratamiento de intoxicaciones. Para prevenir en caballos de carrera la epistaxis, 0.5 a 1 mg/kg (0.5 a 1 ml/50 kg de peso vivo) por vía intravenosa o intramuscular cada 8 a 12 horas. En equinos la dosis se puede aumentar a efecto hasta 6 mg/kg.



DIURAVET: es un diurético, su principio activo la furosemida está clasificado como salurético y se caracteriza por ejercer su efecto sobre el asa de Henle. indicado en todos aquellos casos en que haya acumulación de líquidos en el organismo, en caballos de carreras como profiláctico de las hemorragias nasales y para eliminar el exceso de agua tisular en los animales de exposición.

En equinos se recomienda administrar de 5 a 10 ml cada 8 a 12 horas.



DIURIDE: Es un diurético sumamente eficaz para el tratamiento de edemas inflamatorios y no inflamatorios. Es ideal para el tratamiento de todo tipo de estados edematosos, Indicado para su uso en el tratamiento para la reducción de edemas y ascitis, como coadyuvante en la eliminación de acumulaciones de líquidos patológicos inflamatorios y no inflamatorios, tisulares y cavitarios, a través de la orina.

La dosis sugerida es 1 ml/50 kg de peso en bovinos.



DIRULAN: es un diurético de acción rápida, se emplea en todos aquellos casos en que se requiera la eliminación de líquidos orgánicos retenidos a través de la orina. Indicado en el tratamiento Golpe de calor, Insuficiencia Cardíaca Congestiva. Edema pulmonar, Falla renal, Asitis, Antihipertensivo.

La dosis recomendada en caninos es de 50 mg.



FUROSORAL: Fármaco diurético para el tratamiento del hidrotórax, hidropericardio, ascitis y edemas, especialmente los asociados a insuficiencia cardíaca y disfunción renal.

Se administra por via oral la dosis de inicio recomendada es de 2,5-5 mg de furosemida por kg de peso corporal al día, correspondientes a 1/2-1 comprimido por 2 kg de peso corporal. En los casos resistentes al tratamiento o edematosos graves, la dosis diaria puede aumentarse inicialmente al doble

