



Mi Universidad

Nombre del Alumno CUAMATZI ALVARADO HAGUIN

Parcial TERCER P.

Nombre de la Materia Farmacología veterinaria

Nombre del profesor Lucia Guadalupe González

Cuatrimestre CUARTO CUATRIMESTRE



Dosis: Bovinos doble propósito, ovinos, caprinos, equinos y porcinos: 10 mg /Kg por día de 5 a 7 días.
Caninos y felinos: 10 a 20 mg/Kg por día de 5 a 7 días.
Aves de postura 25 a 50 mg/Kg por día de 5 a 7 días



7.5 mg/kg de peso, que en la práctica corresponden a 7.5 ml por cada 100 kg de peso vivo.



Becerras y lechones: 1.0 g por cada 10.0 kg de peso corporal, por 3 a 6 días.
Bovinos y porcinos adultos: 0.5 g por cada 10.0 kg de peso corporal, por 3 a 6 días.



1 mg/Kg igual a 1 ml/ 10 Kg de peso corporal una vez al día hasta por 5 días consecutivos



0.5 a 1 ml de GASTRINE INJECTION cada 10kg de peso. Cada 6-8 horas en pequeños animales.
0,8ml de GASTRINE INJECTION cada 100 kg/h en infusión continua.

miro