

Nombre de alumnos: Diana Carolina Solís García

Nombre del profesor: Lucía Gonzales

Nombre del trabajo: Súper Nota

Materia: Farmacología veterinaria II

Grado: 4°

Grupo: Medicina veterinaria y Zootecnia

Comitán de Domínguez Chiapas a 27 de octubre del 2021.

Metoclopramida

Benzamidina que pertenece al grupo de los neurolépticos que se utiliza por sus propiedades antieméticas y procinéticas para la prevención y tratamiento de náuseas y vómitos así como en los trastornos funcionales de aparato digestivo.

Dosis caninos

0.25- 0.5 mg/kg cd 12hrs VI
IM SC

0.17-0.33 mg/kg cd/24hrs



Ondansetrón

Para prevenir las náuseas y vómitos causados por la quimioterapia, radioterapia y cirugía debido al cáncer. Pertenece a los antagonistas receptores de serotonina 5-HT₃

Perros y gatos

0.5 mg / kg IV cd 6 o 12hrs
1 mg / kg cd 12hrs



Antieméticos

Cerenia - Citrato de maropitant

Indicado para la prevención y el tratamiento de la náusea y del vómito agudo en perros y gatos.

1 mg /kg cd 12hrs o 2mg/ kg cd 24hrs en perros

Marero por movimiento comprimidos 8mg/kg cd 24hrs

Administrar 1hr antes del viaje



Solución salina hipertónica VO

Irritación del sistema digestivo que procede al vomito



Antieméticos

Apomorfina

Estimula receptores dopamina centro vómito + leve depresor SNC.

Gatos → Excitación (α_2 contraindicado).

IV → Vómito al momento.

IM o SC → Vómito en 5 min

