



Nombre: Karenn Lucía González Aguilar

Nombre del profesor: Ana Gabriela Villafuerte

Nombre del trabajo: mapa conceptual

Materia: Fisiología y reproducción

Carrera: Medicina Veterinaria y zootecnia

Grado: 4to Cuatrimestre

Grupo: A

EL PARTO

Factores desencadenantes del parto.

Son

- Uterinos: distensión abdominal
- Feto tiene lugar por medio de su propia secreción de oxitocina
- Cérvix: la estimulación del cuello provoca una descarga de prostaglandinas uterinas capaces

basada en la identificación de variables jerárquicamente definidas como las de mayor incidencia en la estructura y funcionamiento de intensidad tecnológica

Control endocrino del parto

Es

El sufrimiento fetal origina que el hipotálamo fetal secrete la hormona liberadora de la ACTH, que a la vez desencadena la liberación de la ACTH por la adenohipófisis

Hormonas involucradas

relaxina, la cual causa el reblandecimiento del tejido conectivo del cérvix, y promueve la elasticidad de los ligamentos pélvicos; su síntesis es estimulada por la PGF2alfa

Fases del parto

son

Se sabe que el feto es el responsable del inicio del parto, al originar una compleja cascada de fenómenos endócrinos que promueven el inicio de las contracciones

fases

- la corteza adrenal del feto se vuelve paulatinamente más sensible a la hormona adrenocorticotrópica
- La expulsión exitosa del feto requiere fuertes contracciones del miometrio y de los músculos abdominales de la madre.
- En la mayoría de las especies, la expulsión de las membranas fetales ocurre inmediatamente después de la expulsión del feto

Inducción del parto

Métodos

El método utilizado para lograr inducir el parto, es la administración de corticosteroides

Maniobras obstétricas

Son

- DESPROPORCIÓN FETO- PELVICA
- LABOR INEFECTIVA
- INCOORDINACIÓN DE LAS CONTRACCIONES DEL MIOMETRIO.
- DILATACIÓN INCOMPLETA DEL CÉRVIX
- ALINEAMIENTO INCORRECTO DEL FETO

