



- Nombre de alumno: Rebeca Gpe. Álvarez Soto
- Nombre del profesor: Mvz Lucia Guadalupe Gonzalez Santiago
- Nombre del trabajo: Supernotas
- Materia: Zootecnia en pequeñas especies
- Grado: 7mo
- Grupo: Único

Ciclo estral de los caninos



La perra, desde el punto de vista reproductivo, se define como una especie con ciclo sexual monoestríco de ovulación espontánea. El intervalo interestro, definido como el tiempo desde el comienzo de un ciclo estral hasta el inicio del próximo, posee una duración variable de entre 5-11 meses.

Ciclo estral

En este sentido, las perras presentan un intervalo interestro mínimo 120 días que se corresponde con la fase luteal. Nuestras perras domésticas suelen presentar 2 ciclos estrales al año



Proestro

El proestro, fase de incremento de la actividad folicular ovárica que precede al estro, muestra una duración media de 6-11 días (rango de 2-3 hasta 25 días)

Estro

El estro muestra una duración media de 5-10 días. Las manifestaciones clínicas se caracterizan por la aceptación pasiva o activa del macho

Diestro

Periodo de secreción de progesterona a partir de los cuerpos lúteos formados, se inicia en el momento en el que la hembra muestra un rechazo patente a la cópula. Tiene una duración variable en torno a 60-80 días

Anestro

Periodo quiescente del ciclo reproductivo de la perra, muestra una duración mínima de 7 semanas y máxima 1 año. Clínicamente es un periodo de inactividad que se caracteriza por la no atracción del macho y el rechazo a la cópula,

