

CUADRO SINOPTICO

ZOOTECNIA EN CANINOS

PRESENTA EL ALUMNO:

JORGE HUMBERTO HERNANDEZ SAENZ

GRUPO.

**SEPTIMO. Semestre DE MEDICINA
VETERINARIA Y ZOOTECNIA**

Comitán de Domínguez, Chiapas

25 de noviembre de 2021

Introducción:

El siguiente trabajo habla tipos vacunas obligatorias y no obligatorias en caninos.

VACUNAS OBLIGATORIAS EN CANINOS.

Parvovirus

Agente: parvovirus canina
Se puede transmitir por medio de las heces

AGENTE CAUSAL

El Parvovirus Canino (CPV) pertenece al género Parvovirus de la familia *Parvoviridae*.

- DNA de hebra simple
- Pequeños (20-25 nm de diámetro)
- Sin envoltura

Requieren de tejidos en activa proliferación para poder replicarse, como es el caso de corazón en las primeras semanas de vida y las células de las cripta intestinal. En el perro se describen 2 tipos de parvovirus: CPV-1 y CPV-2., dentro del cual encontramos 2 subtipos: 2a y 2b.

Moquillo

Agente: virus RNA
El contagió es por contacto directo.

Conoce más sobre **MOQUILLO CANINO**

¿QUÉ ES?	Es una enfermedad vírica causada por el virus del moquillo, que pertenece a la familia paramyxovirus, lo cual convierte al virus del moquillo en pariente del sarampión.
¿QUÉ OCASIONA?	El moquillo enferma al perro en sus vías respiratorias, sistema digestivo y sistema nervioso y puede ser letal.
¿CUÁNTO TARDA EN MANIFESTARSE?	Un perro contagiado puede tardar varios días y hasta 3 semanas en mostrar síntomas.
SÍNTOMAS	Un síntoma característico es que las almohadillas de los pies del perro pueden estar duras, secas y agrietadas.
DIAGNÓSTICO	A través de análisis de las mucosas, análisis de sangre o heces para diagnosticar si es moquillo o infección bacteriana.
TRATAMIENTO	El moquillo no tiene cura, pero es muy importante que lleves a tu perro al veterinario para tratamientos paliativos.
PREVENCIÓN	Vacunación a las 5 semanas de edad.



Rabia

AGENTE ETIOLÓGICO

- El virus de la rabia es miembro del género **Lyssavirus** de la familia **Rhabdo-viridae**. *Rhabdos*, significa "Cilíndrico" y señala la característica forma alargada de los virus. Sus viriones "con cubierta" contienen RNA monocatenario, no segmentado, dispuesto en sentido negativo.



Coronavirus

Es una enfermedad viral intestinal en los caninos.



VACUNAS NO OBLIGATORIAS EN CANINOS

Leptospirosis



Conclusión:

El siguiente trabajo nos enseña a que como Médicos Veterinarios Zootecnistas aprendamos a que tipo de vacunas se les puede poner a nuestro perros.