

Nombre de alumno: Calvo Alcázar Gabriela

Nombre del profesor: Bataz Morales Rodolfo

Nombre del trabajo: Mapa Conceptual

Materia: Psicopatología II

Grado: 7 Grupo: A

Comitán de Domínguez Chiapas a 29 de octubre de 2021.

- 3.1 DEIRIUM
- 3.2 DELIRIUM POR ABSTINENCIA DE SUSTANCIAS
- 3.3 OTRO DELIRIUM ESPECIFICADO
- 3.4 DELIRIUM NO ESPECIFICADO

DELIRIUM

A. Una alteración de la atención , mantener o desviar la atención) y la conciencia (orientación reducida al entorno).

La alteración aparece en poco tiempo (habitualmente unas horas o pocos días),

C. Una alteración cognitiva adicional déficit de memoria, de orientación, de lenguaje, de la capacidad viso espacial o de la percepción).

Delirium por intoxicación por sustancia

Este diagnóstico debe establecerse en lugar de un diagnóstico de intoxicación por una sustancia cuando los síntomas de los Criterios A

Delirium por abstinencia de sustancia

Este diagnóstico solamente debe establecerse en lugar de un diagnóstico de síndrome de abstinencia de una sustancia cuando los síntomas de los Criterios A y C predominen en el cuadro clínico

Delirium por abstinencia de sustancia

Este diagnóstico solamente debe establecerse en lugar de un diagnóstico de síndrome de abstinencia de una sustancia cuando los síntomas de los Criterios A y C predominen en el cuadro clínico

Delirium debido a otra afección médica

En la anamnesis, la exploración física o los análisis clínicos se obtienen evidencias de que la alteración puede atribuirse a una consecuencia fisiológica de otra afección médica.

Delirium por abstinencia de sustancias. CIE-9-MC. El nombre del delirium por abstinencia de una sustancia o medicamento empieza con la sustancia específica que se supone que está provocándolo (p. ej., alcohol). El código diagnóstico se escoge de los códigos específicos de cada sustancia incluidos en la nota de codificación del conjunto de criterios.

OTRO DELIRIUM ESPECIFICADO

Esta categoría se aplica a las presentaciones en las que predominan los síntomas característicos de un delirium que provocan un malestar clínicamente significativo o deterioro en lo social, laboral u otras áreas importantes del funcionamiento

Los trastornos de la categoría

La categoría de otro delirium especificado se utiliza en situaciones en las que el clínico desea comunicar el motivo específico por el que el cuadro clínico no cumple los criterios de ningún delirium ni ningún trastorno neurocognitivo especifico. Se anota "Otro delirium especificado"

Delirium atenuado

Este síndrome se aplica en los casos de delirium en que la gravedad del tras-torno cognitivo se queda corto con respecto a lo que exige el diagnóstico, o bien cumple algunos de los criterios diagnósticos del delirium pero no todo.

DELIRIUM NO ESPECIFICADO

Esta categoría se aplica a los cuadros clínicos en los que predominan los síntomas característicos de un delirium que provocan un malestar clínicamente significativo o deterioro en lo social

La categoría de delirium no especificado

Se utiliza en situaciones en las que el clínico opta por no especificar el motivo de incumplimiento de los criterios de delirium, e incluye presentaciones en las que no existe suficiente información para hacer un diagnóstico más específico (p. ej., en las salas de urgencias).