MAPA CONCEPTUAL UNIDAD I: PSICOPATOLOGÍA II

SANDRA GUADALUPE FLORES SANTIAGO

19 DE SEPTIEMBRE DE 2021

UNIVERSIDAD DEL SURESTE

Prof. Rodolfo Bataz

PSICOPATOLOGÍA II:

MAPA CONCEPTUAL UNIDAD I

TRANSTORNOS DE BIPOLARIDAD Y OTROS RELACIONADOS

TRANSTORNO MENTAL

*ALTERACIONES DEL ESTADO COGNITIVO

*ALTERACIONES EN LA REGULACIÓN EMOCIONAL

*DISFUNCIÓN EN PROCESOS PSICOLÓGICOS Y BIOLÓGIOCOS

*SE ASOCIAN AL ESTRÉS SIGNIFICATIVO O DISCAPACIDAD SOCIAL, LABORAL O DE OTRA ACTIVIDAD IMPORTANTE

TRANSTORNO BIPOLAR

SUGIERE SEVEROS CAMBIOS DE ESTADO DE ÁNIMO (MANÍA Y DEPRESIÓN), CAMBIOS QUE VARIAN ENTRE DÍAS, SEMANAS Y AÑOS.

SE CLASIFICAN EN:

TRANSTORNO BIPOLAR I:

*PRESENCIA DE POR LO MENOS UN EPISODIO MANIACO + UN EPISODIO HIPOMANIACO O DEPRESIÓN MAYOR A LO LARGO DE SU VIDA.

TRANSTORNO BIPOLAR II:

*NO SUCEDE EL EPISODIO MANIACO, HA TENIDO COMO MÍNIMO UN EPISODIO HIPOMANIACO (4 DÍAS) Y UN EPISODIO DEPRESIVO MAYOR (2 SEMANAS).

TRANSTORNO CICLOTÍMICO:

*ALTERACIÓN CRÓNICA Y FLUCTUANTE DEL ESTADO DE ÁNIMO QUE CONLLEVA A NÚMEROSOS SÍNTOMAS HIPOMANÍACOS Y DEPRESIVOS.

*DURACIÓN DE DOS AÑOS COMO MÍNIMO

TRANSTORNO DEPRESIVO

EL RASGO COMÚN DE ESTOS TRANSTORNOS ES LA PRESENCIA DE UN ÁNIMO TRISTE, VACÍO O IRRITABLE, ACOMPAÑADO DE CAMBIOS SOMÁTICOS Y COGNITIVOS QUE AFECTAN LA CAPACIDAD FUNCIONAL DEL INDIVIDUO.

TRANSTORNO DE DESREGULARIZACIÓN DISRUPTIVA DEL ESTADO DE ÁNIMO:

-ACCESOS DE CÓLERA RECURRENTES QUE SE PRODUCEN 3 O MÁS VECES POR SEMANA

-EL INDIVIDUO ESTÁ IRRITABLE LA MAYOR PARTE DEL DÍA

-LOS SÍNTOMAS ESTÁN PRESENTES DURANTE 12 MESES O MÁS.

TRANSTORNO DEPRESIVO MAYOR:

-ESTADO DE ÁNIMO DEPRIMIDO LA MAYOR PARTE DEL DÍA

-DISMINUCIÓN DEL PLACER E INTERÉS EN LAS ACTIVIDADES

-DISMINUCIÓN O AUMENTO DE PESO SIN DIETA

-INSOMNIO O HIPERSOMIA

-PÉRDIDA DE ENERGÍA

TRANSTORNO DEPRESIVO PERSISTENTE:

-PRESENCIA DE DOS O MÁS SÍNTOMAS DE DEPRESIÓN

-ESTADO DEPRMIDIO LA MAYOR PARTE DEL DÍA DURANTE UN MÍNIMO DE DOS AÑOS

-NO HA TENIDO UN EPISODIO MANÍACO O HIPOMANÍACO

TRANSOTORNO DISFÓRICO PREMESTRUAL:

-LA MAYORÍA DE LOS CICLOS MENSTRUALES PRESENTAN SÍNTOMAS (IRRIBITABILIDAD, ANSIEDAD, DIFIFULTAD DE CONCENTRACIÓN, ETC) ANTES DEL INICIO DE LA MENSTRUACIÓN.