



PASIÓN POR EDUCAR

Nombre de alumno: Karla Paulina López Santis

Nombre del profesor: Aldo Irecta Najera

Nombre del trabajo: Super nota

Materia: Fisiopatología

Grado: 4to

Grupo: B

Comitán de Domínguez Chiapas 09 de octubre 2021

CALCULO DE PROBABILIDADES

- 1.-¿Qué pretende la teoría de la probabilidad? Pretende ser una herramienta para modelizar y tratar con situaciones de este tipo. Por otra parte, cuando aplicamos las técnicas estadísticas a la recogida, análisis e interpretación de los datos.
- 2.-¿Qué proporciona la teoría de la probabilidad? Proporciona una base para evaluar la fiabilidad de las conclusiones alcanzadas y las inferencias realizadas.
- 3.-¿Cuál es el objetivo del cálculo de probabilidades? El objetivo del Cálculo de Probabilidades es el estudio de métodos de análisis del comportamiento de fenómenos aleatorios.
- 4.-¿Qué es un espacio probabilístico o espacio de probabilidad en teoría de probabilidades? es un concepto matemático que sirve para modelar un cierto experimento aleatorio.
- 5.-¿Cuáles son los 3 componentes que en general está compuesto un espacio probabilístico? Primero, el conjunto (llamado espacio muestral) de los posibles resultados del experimento, llamados sucesos elementales. Segundo, por la colección de todos los sucesos aleatorios (no solo los elementales), que es una σ -álgebra sobre. El par es lo que se conoce como un espacio de medida. Por último, una medida de probabilidad o función de probabilidad, que asigna una probabilidad a todo suceso y que verifica los llamados axiomas de Kolmogórov.
- 6.-¿Qué es una probabilidad condicional? Es la probabilidad de que ocurra un evento A, sabiendo que también sucede otro evento B. La probabilidad condicional se escribe $P(A|B)$ o $P(A/B)$, y se lee «la probabilidad de A dado B».
- 7.-¿Cómo puede lograrse el condicionamiento de probabilidades? La probabilidad condicional es la probabilidad de algún evento A, dada la ocurrencia de algún otro evento B. Esto está denotado por $P(A|B)$ y se lee —la probabilidad de A, dado B—. En otras palabras, estamos calculando probabilidades condicionales al conocer información adicional parcialmente a través del experimento.
- 8.-¿Qué es el teorema de Bayes? Es una proposición planteada por el matemático inglés Thomas Bayes (1702-1761)¹ y publicada póstumamente en 1763,² que expresa la probabilidad condicional de un evento aleatorio A dado B en términos de la distribución de probabilidad condicional del evento B dado A y la distribución de probabilidad marginal de solo A.
- 9.-¿Qué es una variable aleatoria? Una variable aleatoria es una función que asigna un valor, usualmente numérico, al resultado de un experimento aleatorio. Por ejemplo, los posibles resultados de tirar un dado dos veces: (1, 1), (1, 2), etc. o un número real (p.e., la temperatura máxima medida a lo largo del día en una ciudad concreta).
- 10.-¿Qué pueden representar los valores posibles de una variable aleatoria? Pueden representar los posibles resultados de un experimento aún no realizado, o los posibles valores de una cantidad cuyo valor actualmente existente es incierto (p.e., como resultado de medición incompleta o imprecisa).

11.-¿Qué es una variable aleatoria en términos formales? Es una función definida sobre un espacio de probabilidad.

12.-¿Qué es necesario en general para trabajar de manera sólida con variables aleatorias? Es necesario considerar un gran número de experimentos aleatorios, para su tratamiento estadístico, cuantificar los resultados de modo que se asigne un número real a cada uno de los resultados posibles del experimento.

13.-¿A qué se le denomina variable aleatoria o estocástica? Se denomina variable aleatoria (o estocástica) a la función que adjudica eventos posibles a números reales (cifras), cuyos valores se miden en experimentos de tipo aleatorio.

14.-¿A qué se refieren las siglas FDA en función de distribución? Función de distribución acumulada. El concepto de FDA puede generalizarse para modelar variables aleatorias multivariantes.

15.-¿A qué se le denomina variable aleatoria discreta? Aquella que sólo puede tomar un número finito de valores dentro de un intervalo. Por ejemplo, el número de componentes de una manada de lobos, puede ser 4 ó 5 ó 6 individuos, pero nunca 5,75 ó 5,87. Otros ejemplos de variable discreta serían el número de pollos de gorrión que llegan a volar del nido o el sexo de los componentes de un grupo familiar de babuinos.

16.-¿Qué tiene asociada toda variable aleatoria discreta? una función de probabilidad, que, a cada valor, le marca la probabilidad de que la variable tome dicho valor. Esta probabilidad viene a jugar el mismo papel que la frecuencia relativa en los temas de estadística.

17.-¿Qué es una variable aleatoria continua? Es una función X que asigna a cada resultado posible de un experimento un número real. Si X puede asumir cualquier valor en algún intervalo I (el intervalo puede ser acotado o desacotado).

18.-¿Cuándo es continua una variable aleatoria X ? si su función de distribución es una función continua.

19.-¿Cuáles son las características de las variables como entidades empíricas del problema de investigación? Están contenidas esencialmente en el título, el problema, el objetivo y las respectivas hipótesis de la investigación. Son aspectos que cambian o adoptan distintos valores.

Son enunciados que expresan rasgos característicos de los problemas medibles empíricamente.

Son susceptibles de descomposición empírica.

20.-¿Qué es la esperanza matemática en estadística? (También llamada esperanza, valor esperado, media poblacional o media) de una variable aleatoria, es el número que formaliza la idea de valor medio de un fenómeno aleatorio.

21.-¿Qué es la esperanza matemática de una variable aleatoria? Es una característica numérica que proporciona una idea de la localización de la variable aleatoria sobre la recta real. Decimos que es un parámetro de centralización o de localización.

22.-¿Cuáles son las distintas características de una distribución? La especificación de la variable aleatoria y su campo de variación.

La especificación de su asignación de probabilidades, mediante la función de distribución.

23.-¿Cómo se calculan los momentos centrados?

24.-¿Cómo queda definida y caracterizada una distribución de probabilidad?

25.-¿Cuáles son los 2 modelos discretos más importantes? Los más importante son los modelos de BERNOUILLI.

26.-¿Cuál es la distribución más importante? (especialmente "la distribución binomial") y la "distribución de Poisson".

27.-¿Qué es la distribución binomial en estadística? Es una distribución de probabilidad discreta que cuenta el número de éxitos en una secuencia de n ensayos de Bernoulli independientes entre sí, con una probabilidad fija p de ocurrencia del éxito entre los ensayos.

28.-¿Cuáles son las propiedades de la distribución binomial? En cada ensayo, experimento o prueba solo son posibles dos resultados (éxito o fracaso). La probabilidad del éxito ha de ser constante. Esta se representa mediante la letra p . La probabilidad de que salga cara al lanzar una moneda es 0,5 y esta es constante dado que la moneda no cambia en cada experimento y las probabilidades de sacar cara es constate. La probabilidad de fracaso ha de ser también constate. Esta se representa mediante la letra $q = 1-p$. Es importante fijarse que mediante esa ecuación, sabiendo p o sabiendo q , podemos obtener la que nos falte. El resultado obtenido en cada experimento es independiente del anterior. Por lo tanto lo que ocurra en cada experimento no afecta a los siguientes. Los sucesos son mutuamente excluyentes, es decir, no pueden ocurrir los 2 al mismo tiempo. No se puede ser hombre y mujer al mismo tiempo o que al lanzar una moneda salga cara y cruz al mismo tiempo. Los sucesos son colectivamente exhaustivos, es decir, al menos uno de los 2 ha de ocurrir. Si no se es hombre, se es mujer y si se lanza una moneda, si no sale cara ha de salir cruz.

29.-¿Cuáles son las condiciones que se deben de cumplir para que surja una distribución binomial?

- El número de ensayos o repeticiones del experimento (n) es constante.
- En cada ensayo hay sólo dos posibles resultados (éxito o fracaso, defectuoso o no defectuoso).
- La probabilidad de cada resultado posible en cualquier ensayo permanece constante.
- En cada ensayo, los dos resultados posibles son mutuamente excluyentes.
- Los resultados de cada ensayo son independientes entre si.

30.-¿Cuándo se da una distribución uniforme discreta? Tenemos esta distribución cuando el resultado de una experiencia aleatoria puede ser un conjunto finito de n posibles resultados, todos ellos igualmente probables.

31.-¿Qué es la distribución Gamma? Este modelo es una generalización del modelo Exponencial ya que, en ocasiones, se utiliza para modelar variables que describen el tiempo hasta que se produce p veces un determinado suceso.