

**UNIVERSIDAD DE SURESTE
LICENCIATURA DE ENFERMERÍA
CAMPUS –COMITÁN**



MATERIA:
EPIDEMIOLOGÍA

NOMBRE DEL ALUMNO:
VERA OSORIO CICLALI

NOMBRE DEL PROFESOR:

LUZ ELENA
CERVANTES MONROY

NOMBRE DEL TRABAJO:
MAPA CONCEPTUAL

GRUPO:
LENOECO120-B

*FECHA DE ENTREGA: VIERNES, 08 DE OCTUBRE DEL
2021*

HISTORIA NATURAL DE LA ENFERMEDAD

Enfermedad en la población

Concepto de Salud

Triada ecológica

Causalidad de la enfermedad

Etapas de las enfermedades

Período prepatogénico

Período patogénico

Período subclínico

Período clínico

Estrategias de prevención

La cadena epidemiológica

Es el aumento de la incidencia de casos similares en poblaciones humanas en un área geográfica determinada. Se define como el estudio de la distribución, frecuencia y determinantes del proceso salud-enfermedad en poblaciones humanas

es una categoría que permite comprender las actitudes individuales, colectivas y sociales frente a un fenómeno dado; siendo importante su abordaje.

Es la interacción de 3 factores, a partir de los cuales, se da un mecanismo de transmisión que produce una enfermedad.

Se define como el estudio de la relación etiológica entre una exposición, por ejemplo la toma de un medicamento y la aparición de un efecto secundario.

- Período prepatogénico, antes de la aparición de la enfermedad, momento en el cual actúan los factores de riesgo. - Período patogénico, durante el transcurso de la enfermedad. o Período presintomático: con la enfermedad instalada pero sin manifestaciones clínicas (subclínica).

El **periodo prepatogénico** se caracteriza porque el organismo se encuentra en equilibrio, está en interacción el agente causal de enfermedad, huésped y ambiente (triada ecológica o epidemiológica).

En el **periodo Patogénico**: Es cuando ya aparece la enfermedad en la persona. Se lleva a cabo en el hombre enfermo y la conforman una serie de etapas, hasta llegar a varios resultados finales. a) Aplicación de un **concepto** de Medicina Preventiva.

Es la etapa en la que hay cambios celulares, tisulares u orgánicos, pero el paciente aún no percibe síntomas o signos de enfermedad, es una fase **subclínica**.

Cuando la enfermedad sobrepasa el umbral de detección dando manifestaciones **clínicas** de la misma. - Fase final o desenlace, el cual puede corresponder a la resolución (con o sin secuelas), la cronicación o la muerte del individuo.

Es primaria pueden estar dirigidas a prohibir o disminuir la exposición del individuo al factor nocivo, hasta niveles no dañinos para la salud.

Agente Causal
Reservorio
Fuente
Mecanismo de transmisión
Huesped susceptible