

**Nombre de alumno: Ayla Ebed Zacarías
Bartolón**

**Nombre del profesor: Daniela Monserrat
Méndez Guillen**

Nombre del trabajo: Supernota

PASIÓN POR EDUCAR

**Materia: Nutrición en enfermedades
gastrointestinales**

Grado: 4° cuatrimestre


Grupo: "A"

Enfermedades gastrointestinales

Litiasis hepática

La litiasis biliar o colelitiasis es el trastorno digestivo más frecuente como causa de ingreso hospitalario en países europeos


- La colelitiasis puede aparecer a cualquier edad, aunque a medida que avanza, la bilis se vuelve más litogénica, por lo que es más frecuente a partir de los 40 años.
- En los primeros años de vida no existen diferencias en cuanto al sexo y durante la adolescencia y en adultos predomina en el femenino.



Cirrosis hepática

La cirrosis es una etapa tardía de la cicatrización (fibrosis) del hígado producto de muchas formas de enfermedades hepáticas, como la hepatitis y el alcoholismo crónico.


- Cada vez que el hígado sufre una lesión, ya sea por enfermedad, consumo excesivo de alcohol u otra causa, intenta repararse a sí mismo. En el proceso, se forma un tejido de cicatrización. A medida que la cirrosis avanza, se forman cada vez más tejidos de cicatrización, y hacen que el hígado funcione con dificultad (cirrosis descompensada).



Esteatosis hepática

El hígado graso no alcohólico (HGNA) es un síndrome caracterizado por la presencia de depósitos de grasa en el hígado en pacientes sin consumo de alcohol y en ausencia de otras causas de enfermedad hepática.

- Estos excesos de grasa en el hígado se denomina esteatosis hepática.



Cáncer hepática

El cáncer de hígado es un cáncer que comienza en las células hepáticas. Se pueden formar varios tipos de cáncer en el hígado.

- El tipo más común de cáncer de hígado es el carcinoma hepatocelular, que comienza en el tipo principal de célula hepática (hepatocito).
- Otros tipos de cáncer de hígado, como el colangiocarcinoma intrahepático y el hepatoblastoma, son mucho menos comunes.

Síntomas

- Pérdida de apetito
- Dolor en la parte alta del abdomen
- Náuseas y vómitos
- Hinchazón abdominal
- Perdida de peso

