

NOMBRE DEL ALUMNO: CAROLINA AVENDAÑO REYES

NOMBRE DEL PROFESOR: MAHONRRY DE JESUS RUIZ GUILLEN

NOMBRE DEL TRABAJO: MAPA CONCEPTUAL

**MATERIA: ENFERMERIA CLINICA** 

**GRADO: CUARTO CUATRIMESTRE** 

GRUPO: 4"A

Comitán de Domínguez Chiapas

## **VENDAJES**

¿QUÉ ES?

Un vendaje consiste en envolver una parte del cuerpo que está lesionada por diversos motivos con paños de lino o de lana unidas entre sí y colocadas en un orden racional.

CLASIFICACION

- Vendaje blando o contentivo: Utilizado para sostener las piezas de una cura o apósito.
- Vendaje compresivo: Utilizado para ejercer una compresión progresiva a nivel de una extremidad, de la parte distal a la proximal, con el fin de favorecer el retorno venoso.
- Vendaje rígido: Con él se logra una inmovilización completa de la parte afectada.
- Vendaje suspensorio: Sostenedor del escroto o de la mama.
- Vendaje proyectivo: Tiene como objetivo cubrir una parte sana o enferma para protegerla de una acción nociva.

**FUNCION** 

Son los refuerzos o contenciones realizados con un material indicado para ello, con el fin de envolver una extremidad u otras partes del cuerpo humano lesionadas. En Primeros Auxilios se usan especialmente en caso de heridas, hemorragias, fracturas, esguinces y luxaciones.

- TECNICA
- Circular: Es utilizado para finalizar o iniciar un vendaje. Consiste en dar vueltas en círculo sobre sí mismo llegando a cubrir por completo la vuelta anterior. (Ver anexo imagen 2).
- Espiral: Suele ser utilizada en las extremidades. Con cada vuelta de la venda se cubre la mitad de la vuelta anterior, se realiza en sentido desde la zona más distal hacia la proximal. Su utilidad es compresiva o de protección. (Ver anexo imagen 3)
- En ocho: Usada para vendar articulaciones. Se inicia con dos vueltas circulares en la zona proximal, luego se suceden vueltas ascendentes y descendentes que van cruzándose en el centro de la articulación formando la figura de un ocho. Es muy utilizada en rodillas y codos. (Ver anexo imagen 4)
- Espiga: Cada vuelta de la venda cubre la anterior por la mitad con una inclinación de unos 45º, en la primera vuelta se realizara hacia arriba y la segunda vuelta en sentido contrario, aplicando más tensión en las vueltas que se dirigen hacia arriba. (Ver anexo imagen 5)
- Recurrente: Utilizada en dedos, cabeza o muñones. Se inicia con dos vueltas circulares en la zona más proximal, luego se dobla y se realiza una vuelta para cubrir la zona más distal de anterior a posterior terminando cada vez con una vuelta circular.