



Nombre de alumno: Luis Ángel Albores Sántiz.

Nombre del profesor: Beatriz Gordillo.

Nombre del trabajo: Mapa conceptual “Fisiopatología hepática”.

Materia: Fisiopatología I.

Grado: 4to cuatrimestre.

Grupo: “A”

HEPATITIS

Es una inflamación del hígado. Inflamación es la hinchazón de órgano que ocurre cuando se lesionan o infectan, y puede dañar su hígado.

TIPOS

Hepatitis A

Hepatitis B

Hepatitis C

SINTOMAS

- Fiebre, náuseas, vómito, pérdida del apetito y cansancio.
- Dolor en el hígado, piel u ojos amarillos ictericia, orinas oscura y heces blanquecinas.
- Los niños pueden no presentar síntomas.
- Cuadro de hepatitis fulminante.

Los síntomas varían y pueden incluir color amarillento de los ojos, dolor abdominal y orina oscura. Algunas personas, especialmente los niños, no experimentan síntomas. Los casos crónicos pueden incluir insuficiencia hepática, cáncer o cicatrices.

Muchas personas no presentan síntomas. Quienes si los desarrollan pueden presentar fatiga, náuseas, pérdida del apetito y un color amarillo en los ojos y la piel.

TRATAMIENTO


Dependen del tipo de hepatitis. La hepatitis viral se puede tratar con medicamentos virales.

La afección suele desaparecer por si sola. Los casos crónicos requieren medicación y, posiblemente, un trasplante de hígado.

Se trata con medicamentos antivirales. En algunas personas, los fármacos más recientes pueden erradicar el virus.

ENFERMEDAD HEPATICA ALCOHOLICA

Es la inflamación del hígado a causa de la ingesta de alcohol. Es más probable que la hepatitis alcohólica se presente en personas que debe en abundancia durante muchos años.



TIPOS

Esteatosis

Acumulación excesiva de grasa en el hígado.

Hepatitis alcohólica

Inflamación del hígado ocasionada por la ingesta excesiva de alcohol.

Cirrosis

Lesión hepática crónica ocasionada por una variedad de causas que lleva a la formación de cicatrices y la insuficiencia hepática.

SINTOMAS

Esteatosis

Es siempre asintomática.

Hepatitis alcohólica

Suele cursar con síntomas de enfermedad general tales como: cansancio, falta de apetito, malestar digestivo, dolor en el lado derecho del abdomen y a veces fiebre letérgica, ascitis.

Cirrosis

Color amarillo de la piel (ictericia) hemorragia digestiva ascitis cambio de la conducta y en el nivel de conciencia y desnutrición fundamentalmente.

TRATAMIENTO

Consiste en reducir los factores de riesgos, como la obesidad, mediante la dieta y la actividad física.

Requiere hidratación, cuidado nutricional y dejar de tomar alcohol. Los fármacos esteroides pueden reducir la inflamación del hígado.

Se especializan en la causa subyacente. En los casos avanzados, puede ser necesario hacer un trasplante de hígado.

COLESTASIS

Disminución o interrupción del flujo biliar.
Labilis es el líquido digestivo producido por el hígado.

CAUSAS

Dentro del hígado

Hepatitis aguda
enfermedad hepática
alcohólica colangitis
biliar primaria con
inflamación y
cicatrización de las
vías biliares cirrosis
por hepatitis vírica B o
C colestasis del
embarazo.

Fuera del hígado

Calculo en una
vía biliar,
estenosis, cáncer
de páncreas e
inflamación
"pancreatitis"

SINTOMAS

Ictericia, orina
oscura, deposición
de color claro y
picor
generalizado.

DIAGNOSTICO

Análisis de sangre

Ecografía

Biopsia hepática

TRATAMIENTO

Debe ocuparse de la
afección subyacente y
varias desde cambios
en la dieta y
medicación hasta
procedimientos
quirúrgicos.

LITIASIS BILIAR

Es la presencia de cálculos de piedras en la vesícula biliar o en los conductos biliares

