

UNIVERSIDAD DEL SURESTE

PSIQUIATRIA

Docente: Mtra. Lourdes Yazmín Sarabía González

"PREGUNTAS DE TRASTORNO DE IDENTIDAD
DISOCIATIVO"

Alumnos:

Marcos Francisco González Moreno

Estefanía Antonieta Flores Courtois

Quinto semestre

Medicina humana

ESTEPHANIA

1. ¿Qué es una disociación?

R: se trata de una interrupción y/o discontinuidad en la integración normal de la conciencia, la memoria, la identidad propia y subjetiva, la emoción, la percepción, la identidad corporal, el control motor y el comportamiento

2. Los trastornos de identidad disociativo se consideran un mecanismo de....

R: Mecanismo de defensa psicológico mediante el cual la persona enfrenta una experiencia traumática

3. Menciona el criterio diagnóstico A del trastorno de identidad disociativo

R: Perturbación de la identidad que se caracteriza por dos o más estados de la personalidad bien definidos, que se puede describir en algunas culturas como una experiencia de posesión

4. “La alteración no es una parte normal de una práctica cultural o religiosa ampliamente aceptada” ¿esta descripción se trata del criterio B?

R: FALSO la descripción es del criterio D

5. Los niños con Trastorno de identidad disociativo presentan cambios de identidad que se pueden describir en algunas culturas como una experiencia de posesión

R: FALSO, los niños no presentan cambios de identidad, sino que presentan principalmente solapamientos e interferencias entre los estados mentales

MARCOS

1. ¿Qué ocurre en un Flashback disociativo?

R: revivir el trauma, con una reducción de la conciencia de la orientación actual

2. Menciona un síntoma neurológico inexplicable que pueden presentar las personas con “TID”

R: convulsiones no epilépticas, parálisis o pérdida sensorial “cualquiera de las 3 son correctas”

3. ¿Qué género predomina a tener TID en la práctica clínica de los adultos?

R: Mujeres con TID predominan en la práctica clínica de los adultos, pero no en la práctica clínica de los niños.

4. Los individuos con trastorno de identidad disociativo a menudo se diagnostican de trastorno bipolar, más frecuentemente de trastorno bipolar I

R: FALSO son frecuente del tipo II

5. ¿Cuáles son los desencadenantes más comunes de los estados disociativos agudos?

R: Guerras, Condiciones carcelarias y Agresiones físicas o sexuales