



**Mi Universidad**

## **Cuadro comparativo**

Nombre del Alumno: Daniela Paola Sánchez Pastrana

Nombre del tema: Generalidades, trastornos de bipolaridad y otros trastornos relacionados

Parcial: 1

Nombre de la Materia: Psicopatología II

Nombre del profesor: Liliana Villegas López

Nombre de la Licenciatura: Psicología General

Cuatrimestre: 7

*Pichucalco Chiapas, a 26 de septiembre de 20221.*

## Generalidades, trastornos de bipolaridad y otros trastornos relacionados

Tipos de trastornos	Definición
1o- Trastorno mental	Un trastorno mental es un síndrome caracterizado por una alteración clínicamente significativa del estado cognitivo, la regulación emocional o el comportamiento del individuo que refleja una disfunción de los procesos psicológicos o del desarrollo que subyacen en su función mental.
2o- Trastorno bipolar y otros relacionados	El trastorno bipolar y los trastornos relacionados, están en el DSM-5, separados de los trastornos depresivos y situados entre el capítulo dedicado al espectro de la esquizofrenia y otros trastornos psicóticos y el dedicado a los trastornos depresivos, en reconocimiento de su condición de puente entre las dos clases diagnóstica en termino de sintomatología, historia

## Generalidades, trastorno de bipolaridad y otros trastornos relacionados

### 3a- Trastorno bipolar

**Episodio maniaco:** Un período bien definido de estado de ánimo anormal y persistentemente elevado, expansivo o irritable, y un aumento anormal y persistente de la actividad o energía, que dura como mínimo una semana y está presente la mayor parte del día casi todos los días.

**Episodio hipomaniaco:** Un período bien definido de estado de ánimo anormal y persistentemente elevado, expansivo, o irritable, y un aumento anormal y persistente de la actividad o la energía, que dura como mínimo cuatro días consecutivos y está presente la mayor parte del día casi todos los días.

**Episodio de depresión mayor:** Cinco o más de los síntomas siguiente han estado presente durante el mismo período de dos semanas y representa un cambio del funcionamiento anterior.

## Generalidades, trastorno de bipolaridad y otros trastornos relacionados

Trastorno bipolar I: la aparición del episodio maníaco y depresión mayor no se explica mejor por un trastorno equizaafectivo, equizofrenia, un trastorno equizofreniforme, un trastorno delirante u otro trastorno del espectro de la esquizofrenia y otros trastornos psicóticos especificado o no especificados.

### 40- Trastorno bipolar II

Episodio hipomaniático: Un período bien definido de estado de ánimo anormal y persistente elevado, expansivo o irritable, y un aumento anormal y persistente de la actividad o la energía, que dura como mínimo cuatro días consecutivos y está presente la mayor parte del día, casi todos los días.

Episodio de depresión mayor: Cinco o más de los síntomas han estado presente durante el mismo período de dos semanas y representan un cambio en el funciona-

## Generalidades, trastorno de bipolaridad y otros trastornos relacionados

### 50- Trastorno bipolar

Funcionamiento anterior

Episodio maníaco: Un período bien definido de estado de ánimo anormal y persistentemente elevado, expansivo o irritable, y un aumento anormal, y persistente de la actividad o la energía, que dura como mínimo una semana y está presente la mayor parte del día, casi todos los días.

Episodio hipomaníaco: Un período bien definido de estado de ánimo anormal y persistentemente elevados, expansivos o irritables, y un aumento anormal y persistente de la energía, que dura como mínimo cuatro días consecutivos y está presente la mayor parte del día, casi todos los días.

Episodio de depresión mayor: Cinco o más de los síntomas siguientes han estado presente durante el mismo período de dos semanas y representan un

## Generalidades, trastornos de bipolaridad y otros trastornos relacionados

cambio del funcionamiento anterior

Trastorno bipolar I: la aparición de episodio maníaco y de depresión mayor no se explica mejor por un trastorno equizoafectivo, esquizofrenia, un trastorno esquizofreniforme, un trastorno delirante u otro trastorno del espectro de la esquizofrenia y otros trastornos psicóticos especificados o no especificados

### 60- Trastorno bipolar II

Episodio hipomaníaco: un período bien definido de estado de ánimo anormal y persistentemente elevado, expansivo o irritable, y un aumento anormal y persistente de la actividad o la energía, que dura como mínimo cuatro días consecutivos y está presente la mayor parte del día, casi todo los días.

Episodio de depresión mayor: Cinco de los síntomas siguientes han estado presente durante

## Generalidades, trastorno de personalidad y otros trastornos relacionados

el mismo período de dos semanas y representan un cambio del funcionamiento anterior.

### Trastorno bipolar II

Se ha cumplido los criterios al menos para un episodio hipomaniaco y al menos para un episodio de depresión mayor.

### 7o. Trastorno ciclotímico

El rasgo principal del trastorno ciclotímico es una alteración crónica y fluctante del estado de ánimo que conlleva numerosos períodos de síntomas hipomaniacos y período de síntomas depresivos que son distintos entre sí (criterio A)

### 8o. Trastorno depresivo

Los trastornos depresivos son el trastorno de desregulación disruptiva del estado de ánimo, el trastorno de depresión mayor, el trastorno depresivo persistente, el trastorno disfórico premenstrual, el trastorno depresivo inducido por una sustancia/medicamento, el trastorno depresivo especificado y otro trastorno no especificado.

## Generalidades, trastornos de bipolaridad y otros trastornos relacionados

9o- Trastorno de desregulación disruptiva del estado de ánimo	Acceso de cólera graves y recurrentes que se manifiestan verbalmente y/o con el comportamiento cuya intensidad o duración son desproporcionales a la situación o provocación
10o- Trastorno de desregulación disruptiva	El rasgo central del trastorno de desregulación disruptiva del estado de ánimo es una irritabilidad crónica grave y persistente
11o- Trastornos bipolares	El rasgo central que diferencia el trastorno de desregulación disruptiva del estado de ánimo y los trastornos bipolares en los niños está relacionado con el curso longitudinal de los sistemas nucleares
12o- Trastornos negativistas desafiantes	Son la presencia de ataques de cólera graves y frecuentes, y una alteración persistente del ánimo entre los ataques
13o- Trastorno depresivo mayor	Episodios maníacos con ánimo irritable o episodios mixtos; los episodios de depresión mayor con marcado ánimo irritable pueden ser



## Generalidades, trastorno de bipolaridad y otros trastornos relacionados

difíciles de diferenciar de los episodios maníacos con ánimo irritable o de los episodios mixtos.

Trastorno del humor debido a otra afección médica. El diagnóstico apropiado es un episodio mayor y se debería basar en la historia personal, el examen físico y las pruebas de laboratorio, sino se considera que el trastorno del ánimo es consecuencia directa de una afección médica específica.

Trastorno depresivo o bipolar inducido por una sustancia/ medicamento. Este trastorno se distingue del trastorno depresivo mayor por el hecho de que existe una sustancia que parece estar etiológicamente relacionada con la alteración del ánimo.

Trastorno por déficit de atención/hiperactividad o la distrabilidad y la baja tolerancia a la frustración pueden aparecer tanto en el trastorno por déficit de atención/hiperactividad como

## Generalidades, trastorno de bipolaridad y otros trastornos relacionados

el episodio mayor; si se cumple los criterios de ambos, se debería diagnosticar el trastorno por déficit de atención/hiperactividad además del trastorno del ánimo.

Trastorno de adaptación con ánimo deprimido: El episodio de depresión mayor que ocurre en respuesta a un factor estresante psicossocial se distingue del trastorno de adaptación con ánimo deprimido por el hecho de que los criterios diagnósticos completos del episodio mayor no se cumplen en el trastorno de adaptación.

Tristeza en los períodos de tristeza son aspectos inherentes de la experiencia humana.

### 140- Trastorno depresivo persistente (distimia)

Es un ánimo deprimido que aparece la mayor parte del día, durante la mayor parte de los días, durante al menos dos años o al menos durante un año en los niños y los adolescentes (criterio A).

## Generalidades, trastorno de bipolaridad y otros trastornos relacionados

trastorno depresivo mayor: Si existe ánimo deprimido además de dos o más síntomas de los criterios del episodio depresivo persistente durante dos o más años, entonces se realiza el diagnóstico del trastorno depresivo persistente.

Trastornos psicóticos: Los síntomas depresivos son un rasgo común que asocia a los trastornos psicóticos crónicos.

Trastorno depresivo o bipolar inducido por sustancias / medicamentos: El trastorno depresivo o bipolar se distingue del trastorno depresivo persistente cuando se considera que hay una sustancia que podría estar etiologicamente relacionado con la alteración del ánimo.

Trastorno de la personalidad: A menudo hay signos de la coexistencia de alteraciones de la personalidad.

## Generalidades, trastorno de bipolaridad y otros trastorno relacionados

15.- Trastorno  
disfórico  
premenstrual

El síndrome premenstrual difiere del trastorno disfórico premenstrual en donde no se requiere un mínimo de cinco síntomas y en que no existe un convenio de síntomas afectivos en las mujeres con síndrome premenstrual.

Dismenorrea: Es un síndrome de menstruaciones dolorosas que difiere del caracterizado por cambios afectivos. Comienza al inicio de la menstruación, mientras que los síntomas del trastorno disfórico premenstrual, por definición, comienza antes del inicio de la menstruación, incluso aunque aparezca en los primeros días.