



Mapa Conceptual y Cuadro Sinoptico

Nombre del Alumno: Flor Grisell Zárate Gómez

Nombre del tema: Organización y estructura de los grupos

Parcial: Parcial II

Nombre de la Materia: Psicología Social

Nombre del profesor: Antonio Galera Pérez

Nombre de la Licenciatura: Psicología

Cuatrimestre: 7mo Cuatrimestre

Pichucalco, Chiapas a 11 de Octubre del 2021

EMBARAZO, VIDA PRENATAL, ALUBRAMIENTO Y APEGO

VIDA PRENATAL

- Espermatogénesis
- Ovogénesis
- Concepción

Periodos del desarrollo prenatal

- El periodo germinal
- Periodo embrionario
- Periodo fetal

ENFERMEDADES DE TRANSMISION SEXUAL

- Sífilis
- Herpes genital
- Gonorrea
- Infecciones por clamidia
- Otras enfermedades
 - Poliomielititis
 - Diabetes
 - Tuberculosis
 - Enfermedades de la tiroides

PROBLEMAS FETALES

- Ambientes e influencias prenatales
- Teratógenos
- Sustancias químicas, metales pesados y contaminantes ambientales
- Radiación
- Enfermedades de la madre
- Rubéola
- Toxoplasmosis

FÁRMACOS

- Narcóticos
- Sedantes
- Analgésicos
- Alcohol
- Tranquilizantes
- Antidepresivos
- Nicotina
- Marihuana

SITUACIÓN VITAL DE LA MUJER EMBARAZADA

- Cambios Físicos
- Cambios en el útero
- Vagina
- Vulva
- Cambios en las mamas o pechos
- Peso
- Piel
- Estrías
- Corazón
- Aparato respiratorio
- Aparato digestivo
- Sistema musculoesquelético
- Cambios psicológicos

INFLUENCIA DEL PADRE EN LOS DEFECTOS

- Edad avanzada del padre
- Uso crónico de la marihuana
- Exposición a radiación, plomo, tabaco, arsénico, mercurio, ciertos solventes

OTROS FACTORES

COMPLICACIONES GRAVES DEL EMBARAZO

- Vomito pernicioso
- Toxemia
- Amenaza de aborto
- Placenta previa
- Embarazo extrauterino
- Incompatibilidad RH

MATERNOS

- Edad de la madre
- Nutrición

PROBLEMAS COMUNES EN EL RECIEN NACIDO

DISTENSIÓN ABDOMINAL

Las barrigas de la mayoría de los bebés sobresalen, especialmente después de una toma abundante, sin embargo, entre las tomas, deben sentirse bastante blandas.

Si el abdomen del bebé se siente hinchado y duro, y si no ha tenido una deposición durante más de uno o dos días, se debe llamar al pediatra

Es muy probable que el problema se debe a gases o estreñimiento, pero también podría indicar problema intestinal más grave

DISTENSIÓN ABDOMINAL

Es posible que los bebés se lesionen durante el parto, especialmente si el trabajo de parto es particularmente largo o dificultoso, o cuando los bebés son muy grandes

La debilidad muscular es otra lesión de nacimiento común, causada durante el trabajo de parto por la presión.

Por lo general, estos músculos, que suelen estar debilitados a un lado de la cara o de un hombro o brazo, vuelven a la normalidad después de varias semanas.

SÍNDROME DEL BEBÉ AZUL

Los bebés pueden tener las manos y los pies levemente azulados, pero es posible que esto no sea un motivo de preocupación

Ocasionalmente, la cara, la lengua y los labios pueden volverse poco azulados cuando el bebé no para de llorar, pero cuando se calma, su color en estas partes debe volver a la normalidad rápidamente

Si la piel se vuelve un color azulado de manera persistente, especialmente con dificultades para respirar y alimentarse, esto es un signo de que el corazón o los pulmones no están funcionando correctamente, y de que el bebé no está recibiendo suficiente oxígeno en la sangre

LLANTO EXCESIVO

Todos los recién nacidos lloran, a menudo, sin un motivo aparente. Si se asegura de que el bebé se alimentó, eructó, se mantiene caliente y tiene un pañal limpio, probablemente, la mejor táctica es sostenerlo y hablarle o cantarle hasta que deje de llorar

Se acostumbrará al patrón de llanto normal de su bebé. Si alguna vez suena extraño, como alaridos de dolor, o si alguna vez persiste durante un período inusual, podrá significar un problema médico. Se debe llamar al pediatra y pedir asesoramiento.

PROBLEMAS COMUNES EN EL RECIEN NACIDO

MARCAS DE FÓRCEPS

Cuando se usan fórceps para brindar ayuda durante el parto, estos pueden dejar marcas rojas, o incluso, raspados superficiales en la cara y la cabeza de un recién nacido, en la zona donde el meta ejerció presión sobre la piel

Por lo general, estos desaparecen en pocos días. A veces, se desarrolla un bulto firme plano en una de estas zonas debido a un daño menor en el tejido que se encuentra debajo de la piel.

ICTERCIA

Muchos recién nacidos normales y saludables tienen un tinte amarillento en la piel, que se conoce como ictericia. Esto se debe a una acumulación de una sustancia química, denominada bilirrubina, en la sangre del niño.

Esto ocurre con más frecuencia cuando el hígado inmaduro aún no ha comenzado a cumplir su función de eliminar la bilirrubina del torrente sanguíneo en forma eficiente

La ictericia puede convertirse en una afección grave si la bilirrubina llega a lo que un pediatra considera como un nivel muy alto

La ictericia puede tener más frecuencia en los bebés que están en periodo de lactancia, con más frecuencia en aquellos que no están tomando el pecho correctamente; las madres que están amamantando deben dar el pecho, al menos, entre ocho y doce veces por día, lo que ayudaría a producir suficiente leche y a mantener bajos los niveles de bilirrubina

LETARGO Y ADORMECIMIENTO

Todos los recién nacidos pasan por la mayoría del tiempo durmiendo. Siempre que despierte cada pocas horas, coma bien, parezca estar contento y esté alerta durante parte del día, es totalmente normal al que duerma el resto del tiempo.

Si rara vez está alerta, no se despierta por sí solo para alimentarse, o parece estar demasiado cansado o desinteresado en comer, debe consultar con su pediatra.

Este letargo, especialmente si es un cambio repentino en su patrón habitual, puede ser un síntoma de una enfermedad grave

DIFICULTAD RESPIRATORIA

Es posible que el bebé tarde algunas horas después del nacimiento para formar un patrón normal de respiración, pero, luego, no debería tener más dificultades. Si parece estar respirando de una manera inusual, a menudo, esto se debe a un bloque de conductas nasales

Sin embargo, si el recién nacido muestra alguno de los siguientes signos de advertencia, notifique a su pediatra inmediatamente:

- Respiración rápida (más de sesenta respiraciones en un minuto), aunque debe tener en cuenta que, normalmente, los bebés respiran más rápido que los adultos.
- Retracciones (succión en los músculos que se encuentran entre las costillas con cada respiración, que hace que sus costillas sobresalgan)
- Ensanchamiento de la nariz
- Resoplidos durante la respiración
- Coloración azul de la piel persistente