



Mapa conceptual/Cuadro sinóptico

Luisa Bethel López Sánchez

Unidad II. Embarazo, vida prenatal, alumbramiento y apego

Segundo parcial

Psicología Evolutiva

Mtro. Antonio Galera Pérez

Psicología General

Séptimo cuatrimestre

Pichucalco, Chiapas; 14 de octubre del 2021

EMBARAZO, VIDA PRENATAL, ALUMBRAMIENTO Y APEGO

VIDA PRENATAL

En la reproducción humana participan dos tipos de células sexuales o gametos: el masculino, o célula espermática, y el femenino u óvulo.

ESPERMATOGÉNESIS

es

el proceso de producción de espermatozoides que tiene lugar en los testículos del varón cuando alcanza la pubertad.

OVOGÉNESIS

es

el proceso por el cual los gametos femeninos, denominados óvulos, maduran en los ovarios.

están

presentes desde el nacimiento, aunque subdesarrolladas

CONCEPCIÓN

es

la fecundación de un óvulo por un espermatozoide

y

tiene lugar en el tercio de la trompa de falopio más cercano al ovario

PERIODOS DEL DESARROLLO PRENATAL

son

1. El periodo germinal

que

va de la concepción a la implantación, dura alrededor de 14 días

2. El periodo embrionario

que

inicia de la octava semana al final del embarazo


3. El periodo fetal

que

inicia de la octava semana al final del embarazo

EMBARAZO, VIDA PRENATAL, ALUMBRAMIENTO Y APEGO

PROBLEMAS FETALES



PROBLEMAS FETALES

ENFERMEDADES DE LA MADRE

pueden

cruzar muchas bacterias y virus la barrera placentaria

por

lo que si una mujer embarazada es infectada también resulta infectado el bebé

NUTRICIÓN

la

carencia de vitaminas, minerales y proteínas en la dieta de la mujer embarazada puede afectar de manera adversa el embrión

y

han sido asociadas con muertes neonatales, abortos y deformidades importantes

COMPLICACIONES GRAVES DEL EMBARAZO

cuando

aparecen constituyen una amenaza más seria para la salud y la vida de la mujer y del embrión o feto en desarrollo que las incomodidades menores comunes.

VÓMITO PERNICIOSO

es

un vómito prolongado y persistente que puede deshidratar a la mujer y le quita los nutrientes necesarios para fortalecer el crecimiento fetal.

TOXEMIA

es

por alta presión sanguínea, saturación de agua de los tejidos (edema) indicada por hinchazón de cara y extremidades o por el rápido aumento de peso, albúmina en la orina, dolores de cabeza, visión borrosa y eclampsia (convulsiones).

EMBARAZO, VIDA PRENATAL, ALUMBRAMIENTO Y APEGO

PROBLEMAS FETALES

AMENAZA DE ABORTO

son

sintomas que suelen consistir en sangrado vaginal. Algunos estudios revelan que alrededor de uno de cada seis embarazos es abortado espontáneamente antes de que el feto tenga el tamaño que le permita sobrevivir.

por

esto la mayor parte de los abortos espontáneos ocurren al inicio del embarazo

PLACENTA PREVIA

es

la separación prematura de la placenta de la pared uterina, en general porque la placenta crece parcial o completamente sobre la abertura cervical.

y

una de cada 200 embarazadas sufre de este problema, que suele ocurrir en el tercer trimestre.

EMBARAZO EXTRAUTERINO

ocurre

cuando el óvulo fertilizado se adhiere a la pared de la trompa de Falopio y crece ahí y no dentro del útero.

y

en ocasiones el embarazo, denominado ectópico, se sitúa en el ovario, abdomen o en el cuello uterino.

INCOMPATIBILIDAD RH


ocurre

cuando una madre con sangre tipo Rh negativo lleva un feto con sangre Rh positivo

EMBARAZO, VIDA PRENATAL, ALUMBRAMIENTO Y APEGO


SITUACIÓN VITAL DE LA MUJER EMBARAZADA

En los próximos 9 meses va a experimentar una serie de cambios normales tanto físicos como psicológicos, cada mujer los vive de forma diferente.




SITUACIÓN VITAL DE LA MUJER EMBARAZADA

En los próximos 9 meses va a experimentar una serie de cambios normales tanto físicos como psicológicos, cada mujer los vive de forma diferente.



pueden producir dolores de espalda sobre todo al final del embarazo y una forma de andar característica llamada "marcha de pato".



PROBLEMAS COMUNES EN EL RECIEN NACIDO

TOS

Si el bebé toma líquido muy rápido o trata de beber agua por primera vez, es posible que tosa y escupa un poco; pero este tipo de tos debería detenerse apenas se ajuste a una rutina de alimentación familiar.

Si el bebé tose continuamente o tiene arcadas rutinariamente durante las tomas, consulte con el pediatra.

LLANTO EXCESIVO

Si se ha asegurado de que su bebé se alimentó, eructó, se mantiene caliente y tiene un pañal limpio, probablemente, la mejor táctica es sostenerlo y hablarle o cantarle hasta que deje de llorar

Si alguna vez suena extraño; por ejemplo, como alaridos de dolor, o si alguna vez persiste durante un período inusual, podría significar un problema médico. Llame al pediatra y pídale asesoramiento.

MARCAS DE FÓRCEPS

Cuando se usan fórceps para brindar ayuda durante un parto, estos pueden dejar marcas rojas o, incluso, raspados superficiales en la cara y la cabeza de un recién nacido, en la zona donde el metal ejerció presión sobre la piel.

A veces, se desarrolla un bulto firme y plano en una de estas zonas debido a un daño menor en el tejido que se encuentra debajo de la piel. Sin embargo, esto también suele desaparecer en el término de dos meses

ICTERICIA

Muchos recién nacidos normales y saludables tienen un tinte amarillento en la piel, que se conoce como ictericia.

Esto se debe a una acumulación de una sustancia química, denominada bilirrubina, en la sangre del niño.

Esto ocurre con más frecuencia cuando el hígado inmaduro aún no ha comenzado a cumplir su función de eliminar la bilirrubina del torrente sanguíneo en forma eficiente

Cuando el médico determina que la ictericia está presente y debe ser tratada, el nivel de bilirrubina puede ser reducido colocando al bebé debajo de luces especiales cuando está desvestido, en el hospital o en el hogar.

PROBLEMAS COMUNES EN EL RECIEN NACIDO

LETARGO Y ADORMECIMIENTO

Todos los recién nacidos pasan la mayoría del tiempo durmiendo. Siempre que se despierte cada pocas horas, coma bien, parezca estar contento y esté alerta durante parte del día, es totalmente normal que duerma el resto del tiempo.

Sin embargo, si rara vez está alerta, no se despierta por sí solo para alimentarse, o parece estar demasiado cansado o desinteresado en comer, debe consultar con su pediatra

Este letargo, especialmente si es un cambio repentino en su patrón habitual, puede ser un síntoma de una enfermedad grave.

DIFICULTAD RESPIRATORIA

Es posible que el bebé tarde algunas horas después del nacimiento para formar un patrón normal de respiración, pero, luego, no debería tener más dificultades.

Si parece estar respirando de una manera inusual, a menudo, esto se debe a un bloqueo en los conductos nasales.

Si su recién nacido muestra alguno de los siguientes signos de advertencia, notifique a su pediatra inmediatamente:

Respiración rápida

Retracciones

Ensanchamiento de la nariz

Resoplidos durante la respiración

Coloración azul de la piel persistente

Bibliografía

EMBARAZO, VIDA PRENATAL, ALUMBRAMIENTO Y APEGO. (2021). En *ANTOLOGIA LPS703 PSICOLOGIA EVOLUTIVA* (págs. 30-48).