



Nombre del alumno: Hogla Sangeado
Domínguez

Nombre del profesor: Lic. Javier Gómez
Galera.

Nombre del trabajo: “Asistencia y
cuidados de parto”, “Asistencia y cuidado
en el puerperio”.

Materia: Enfermería en el cuidado de la
Mujer.

4º Cuatrimestre de Enfermería.

Pichucalco Chiapas a 22 de noviembre de 2021.

Asistencia y cuidados de parto.

Cuidados:

En el parto normal debe existir una razón válida para interferir con el proceso natural. Las tareas del personal sanitario son cuatro:

1. Animar a la mujer, su compañero y familia durante el parto, el alumbramiento y el periodo posparto.
2. Observar a la parturienta: monitorizar la condición fetal y la del niño después del nacimiento; evaluar los factores de riesgo; detectar problemas de forma temprana.
3. Llevar a cabo intervenciones menores, si son necesarias, como amniotomía y episiotomía; cuidar del niño después del nacimiento.
4. Trasladar a la mujer a un nivel mayor de asistencia, si surgen factores de riesgo o si aparecen complicaciones que justifiquen dicho traslado.

Complicaciones.

- El trabajo de parto no progresá.
- Desgarros perineales.
- Problemas con el cordón umbilical.
- Frecuencia cardíaca anormal del bebé.
- La fuente se rompe de manera prematura.
- Asfixia perinatal.
- Sangrado excesivo.
- Distocia de hombros.
- Vuelta del cordón.

Asistencia:

El profesional de Enfermería deberá informar, orientar y brindar acompañamiento a la gestante en el reconocimiento de los signos que indican el inicio del trabajo de parto:
□ Expulsión de tapón mucoso: expulsión de una pequeña cantidad de sangre con moco.
□ Inicio de contracciones: a intervalos de 3 en 10 minutos, que se intensifican y se vuelven más frecuentes.
□ Ruptura de membranas: flujo abundante o goteo de líquido amniótico. El objetivo del cuidado prenatal es monitorear la salud de la madre y del feto durante el embarazo. Se deben enseñar a la embarazada qué hacer para que sea responsable de su salud.

Asistencia y cuidados del puerperio.

Asistencia:

- 1) Revisión de historia clínica.
- 2) Chequeo de los signos vitales cada 4 horas.
- 3) Duración, fuerza y frecuencia de cada contracción.
- 4) Palpación abdominal.
- 5) Percepción de dolor.
- 6) Auscultación de la frecuencia cardiaca fetal.
- 7) Realización del tacto vaginal.

Cuidados:

En el puerperio inmediato las principales complicaciones son la hemorragia y el shock hipovolémico, por lo tanto los cuidados de enfermería irán encaminados a vigilar para prevenirlos:

- ◆ Toma de constantes.
- ◆ Vigilar la administración de fármacos oxióticos.
- ◆ Palpar el fondo uterino para comprobar la contracción de éste.
- ◆ Control urinario para controlar si es espontáneo o si necesita un sondaje vesical.
- ◆ Valorar la episiotomía.
- ◆ Valorar el descanso, favorecer la lactancia, y vigilar el estado de las mamas.
- ◆ Vigilar la aparición de los loquios, la cantidad, color y los coágulos si aparecen.

Complicaciones

- ✚ Enfermedades cardiovasculares
- ✚ Otras afecciones médicas que a menudo reflejan enfermedades preexistentes
- ✚ Infección o sepsis
- ✚ Sangrado excesivo después del parto (hemorragia)
- ✚ Una enfermedad del músculo cardíaco que dificulta que el corazón bombee sangre al resto del cuerpo (cardiomiopatía)
- ✚ Una obstrucción en una de las arterias pulmonares, generalmente a causa de coágulos sanguíneos que viajan a los pulmones desde las piernas (embolia pulmonar trombótica)
- ✚ Accidente cerebrovascular
- ✚ Trastornos de presión arterial alta (hipertensión) durante el embarazo
- ✚ Una afección poco común pero grave que ocurre cuando el líquido amniótico o el material embrionario, como las células fetales, ingresan al torrente sanguíneo de la madre (embolia de líquido amniótico)
- ✚ Complicaciones de la anestesia