



**Nombre del alumno:** Blandi Jorgelina  
López García.

**Nombre del profesor:** Lic. Rubén  
Eduardo Domínguez García.

**Nombre del trabajo:** Mapa  
conceptual . Unidad III.

**Materia:** Fundamentos de  
Enfermería 1.

**Grado:** 1er Cuatrimestre

**Grupo:** “A”.

# ELIMINACION INTESTINAL.

## Es esencial para la salud

Es variable de una persona a otra .

Se

Considera anormal cuando sea;  
Verde , Blanca, Roja.

Dentro de ellas se encuentran

Alteraciones.

### ESTREÑIMIENTO

Es

Una disminución de la frecuencia

Y/O

Eliminacion de heces Secas y duras

### FECALOMA

Es la

Presencia de masa fecal, Generalmente muy endurecida en el recto.

### FLATULENCIA.

Es el

Exeso de aire en el intestino produciendo una distencion abdominal

### DIARREA

Es el

Aumento de la frecuencia

Ó

La eliminacion de heces fluidas Seltas.

### INCONTINENCIA FECAL.

Es la

Perdida de la capasidad voluntaria para controlar la evacuación.

## Definicion

• Eliminacion de productos de desecho de la digestion del organismo..

• Proceso mediante en el que se expulsa al exterior las sustancias que no pueden ser reasorvidas por la sangre.y que no son asimilables por el organismo.



# VALORACION DEL PATRON ELIMINACION INTESTINAL.

Se lleva acavo atraves de;

Entrevista.

Examen fisico.

Y

Caracteristicas de las Heces.

Forma.

Se le considera

Normal ;

Debe ser parecida al diamtre rectal

Y

Anormal

Estrecha en firma de lápiz (obstruccion).

Constituyentes

Normal;

Alimentos no dijeridos, bacterias muertas ,grasas pigmentos, agua celulas de mucosa.

Y

Anormal

Se le considera infección o inglamacion ( sangre, pus moco, ). Parasitos ( gusanos). Mala absorción ( exeso de grasas).

Color

Es normal cuando

El color es Lactante ( Amarillo). Adulto( Marron).

Y

Anormal si

Blancas( no bilis). Negras(HDA ingestion Fe). Palido mas grasa(mala absorcion).

Olor

Drpende de la alimentacion (acre).

Anormal si

Cambio nocivo por sangre O infeccion.

Consistencia

Es normal si

Se presentan. Blandas y formadas

Anormal

Si es liquida ( Diarrea). Duras( estreñimiento).

Frecuencia

En adultos Desde una ces al dia, hasta dos 3 veces a la semana Lactante desde 5 a 8 veces Leche materna

Anormal

Adultos( menos de una ves a la semana. estreñimientos). Lactante mas de 6 veces al dia ( diarrea).

Cantidad

No mas de 150 gr

Definicion

Valora la eliminacion de los productos de desecho del organismo, atraves de la via intestinal centrandose en la regularidad y control de la eliminacion. Con el fin de evaluar los patrones habituales.



# CUIDADOS DE ENFERMERIA CON PASIENTES CON PROBLEMAS DE ELIMINACION INTESTINAL

Conjunto de actividades que realiza enfermeria encaminados a fomentar una eliminacion intestinal correcta.

Identificar factores que influyen

En

## MANEJO INTESTINAL.

• Observar si hay sonidos intestinales

• informar acerca de cualquier aumento de frecuencia Y/o sonidos intestinales agudos.

• Observacion y si hay sintomas de diarrea, estreñimiento o impactación.

• Instruir al paciente que registre el color, frecuencia y consistencia de heces.

• Administrar medicamentos segun preinscripción medica.

## MANEJO DE LA DIARREA.

• Evaluar el perfil de medicación para Identificar efectos secundarios.

• Solicital al paciente . Registro y Consistencia de las deposiciones.

• Identificar los factores( medicamentos Bacterias y alimentación) que pueda ocasionar o Contribuir a la existencia de la diarrea.

• Observar si hay irritacion o ulceración En la piel perinal.

• Administrar medicamentos antidiarreicos según Preinscripción medica.