



Nombre de alumnos: Martha María Juárez Pérez

Nombre del profesor: Javier Gómez Galera

Nombre del trabajo: cuadro sinóptico

Materia: CUIDADO DE ENFERMERIA EN LA MUJER

Grado: 4to

Grupo: “B”

PICHUCALCO CHIAPSAS A 17 de septiembre de 2021

A
S
I
S
T
E
N
C
I
A
Y
C
U
I
D
A
D
O
D
E
L
P
A
R
T
O

El cuidado es conseguir una madre y un niño sanos, con el menor nivel posible de intervención de la manera más segura

Fase del trabajo de parto:

Asistencia y cuidado en el puerperio

En el parto normal debe existir una razón válida para interferir con el proceso natural. Las tareas del personal sanitario son cuatro:

1. Animar a la mujer, su compañero y familia durante el parto, el alumbramiento y el periodo posparto.
2. Observar a la parturienta: monitorizar la condición fetal y la del niño después del nacimiento; evaluar los factores de riesgo; detectar problemas de forma temprana.
3. Llevar a cabo intervenciones menores, si son necesarias, como amniotomía y episiotomía; cuidar del niño después del nacimiento.
4. Trasladar a la mujer a un nivel mayor de asistencia, si surgen factores de riesgo o si aparecen complicaciones que justifiquen dicho traslado.

A medida que el nacimiento del bebé se acerca, a la madre cada vez le inquieta más pensar cómo será el parto. Aunque cada alumbramiento es diferente, desde un punto de vista médico, todos pasan por tres fases:

Dilatación: Se corresponde al inicio de contracciones de parto, dilatación del cuello del útero y descenso de la cabeza del feto por el canal del parto.

Expulsión: Es la parte final del parto.

Alumbramiento: Corresponde a la salida de la placenta

El puerperio es una etapa que atraviesa la mujer después del parto. En este proceso la mujer readapta su organismo con numerosos cambios en los que interfieren las hormonas y las nuevas condiciones de ser madre.

- Toma de constantes.
- Vigilar la administración de fármacos oxitócicos.
- Palpar el fondo uterino para comprobar la contracción de éste.
- Control urinario para controlar si es espontáneo o si necesita un sondaje vesical.
- Valorar la episiotomía.
- Valorar el descanso, favorecer la lactancia, y vigilar el estado de las mamas.
- Vigilar la aparición de los loquios, la cantidad, color y los coágulos si aparecen.