



Mi Universidad

CUADRO SINOPTICO

Nombre del Alumno: Guadalupe Recinos Vera

Nombre del tema: Espectro de la esquizofrenia y otros trastornos "trastorno delirante"

Parcial: I

Nombre de la Materia: Psicopatología II

Nombre del profesor: Bella Raquel López García

Nombre de la Licenciatura: Psicología

Cuatrimestre: 7mo

Grupo: "A"

Frontera Comalapa, Chiapas 03 de octubre del 2021

Espectro de la esquizofrenia y otros trastornos "trastorno delirante"

Esquizofrenia y trastorno esquizofreniforme.

Puede distinguirse de la esquizofrenia y del trastorno esquizofreniforme por la ausencia de los demás síntomas característicos de la fase activa de la esquizofrenia.

Trastornos depresivos y bipolares y trastorno esquizoafectivo.

Estos trastornos pueden diferenciarse del trastorno delirante por la relación temporal entre la alteración del estado de ánimo y los delirios, y por la gravedad de los síntomas del estado de ánimo.

Trastorno psicótico breve

- A. Presencia de uno (o más) de los síntomas siguientes:
 1. Delirios.
 2. Alucinaciones.
 3. Discurso desorganizado
 4. Comportamiento muy desorganizado o catatónico.

Implica el inicio brusco de, al menos, uno de los siguientes síntomas psicóticos positivos: delirios, alucinaciones, discurso desorganizado

- Diagnostica diferencial
- Trastornos depresivos y bipolares
- Otros trastornos psicóticos

Implica el inicio brusco de, al menos, uno de los siguientes síntomas psicóticos positivos: delirios, alucinaciones, discurso desorganizado
no puede realizarse si los síntomas psicóticos se explican mejor por un episodio del estado de ánimo
Si los síntomas psicóticos persisten durante 1 mes o más, el diagnóstico será de trastorno esquizofreniforme, trastorno delirante, trastorno depresivo con características psicóticas, trastorno bipolar con características psicóticas u otro trastorno del espectro de la esquizofrenia especificado o no especificado

Trastorno esquizofreniforme.

- Dos (o más) de los síntomas siguientes, cada uno de ellos presente durante una parte significativa de tiempo durante un período de un mes.
 1. Delirios.
 2. Alucinaciones.
 3. Discurso desorganizado
 4. Comportamiento muy desorganizado o catatónico.
 5. Síntomas negativos

- Con características de buen pronóstico.
- Sin características de buen pronóstico.
- Características diagnósticas

Aparición de síntomas psicóticos notables en las primeras cuatro semanas después del primer cambio apreciable del comportamiento o funcionamiento habitual; confusión o perplejidad; buen funcionamiento social y laboral antes de la enfermedad; y ausencia de afecto embotado o plano.
Especificar si: Con catatonía, La gravedad se clasifica mediante una evaluación cuantitativa de los síntomas primarios de psicosis: delirios, alucinaciones, discurso desorganizado, comportamiento psicomotor anormal y síntomas negativos.
El trastorno esquizofreniforme se distingue por su diferente duración: la duración total de la enfermedad, incluidas las fases prodrómica, activa y residual, es de al menos 1 mes pero menor de 6 meses