



Mi Universidad

Nombre del Alumno: Rosa Elena López Solís

Nombre del tema: Trastorno mental

Nombre de la Materia: psicopatología 2

Nombre del profesor: Bella Raquel López García

Nombre de la Licenciatura: Psicología

Cuatrimestre: 7mo cuatrimestre

Trastorno mental

Es una afección del estado de ánimo que puede provocar cambios de ánimo intensos

TRASTORNO BIPOLAR

Episodio de depresión mayor

TRASTORNO BIPOLAR 1

Episodios maníacos

Episodio hipomaníaco

Síntomas

Procedimientos de codificación y registro

Características diagnósticas

Otras afecciones médicas

¿QUE ES?

¿QUE ES?

Es un periodo delimitado y persistente, durante el cual hay un estado de ánimo anormalmente elevado, expansivo o irritable.

son menos graves que los episodios maníacos, aunque este todavía puede interferir en su capacidad para desempeñarse de manera adecuada.

Han estado presentes cinco o más durante el mismo período de dos semanas

Episodio actual o más reciente

La gravedad actual

TALES COMO

No cuentan para el diagnóstico de trastorno bipolar

A CONTINUACION

TALES COMO

Los síntomas maníacos o los síndromes que son atribuibles a los efectos fisiológicos de una droga de abuso

Durante el período de alteración del estado de ánimo.

TAMBIEN

En un grado significativo y representan un cambio notorio del comportamiento habitual

A CONTINUACION

1. Aumento de la autoestima o sentimiento de grandeza
2. Disminución de la necesidad de dormir
3. Más hablador de lo habitual
4. Fuga de ideas
5. Facilidad de distracción
6. Aumento de la actividad dirigida a un objetivo
7. Participación excesiva en actividades que tienen muchas posibilidades de consecuencias dolorosas

A CONTINUACION

NO OBSTANTE

PARA ACABAR

1. Estado de ánimo deprimido
2. Disminución importante del interés o el placer por todas.
3. Pérdida importante de peso sin hacer dieta o aumento de peso.
4. Insomnio o hipersomnia
5. Agitación o retraso psicomotor
6. Fatiga o pérdida de la energía
7. Sentimientos de inutilidad o de culpabilidad excesiva o inapropiada
8. Disminución de la capacidad para pensar o concentrarse.
9. Pensamientos de muerte recurrentes

El episodio no se puede atribuir a los efectos fisiológicos de una sustancia o de otra

La presencia de características psicóticas y el estado de remisión

COMO RESULTADO

Causan malestar clínicamente significativo

Deterioro en lo social, laboral u otras áreas importantes del funcionamiento

- El lenguaje puede ser rápido, con apremio, chillón y difícil de interrumpir
- Los pensamientos del individuo van a menudo más rápido de lo que puede expresar verbalmente
- El aumento de la actividad con fines concretos
- Los individuos con episodio maníaco presentan una mayor sociabilidad
- Presentan agitación psicomotriz o inquietud
- Estado de ánimo eufórico, excesivamente alegre.
- El individuo se embarca en tareas complicadas
- El individuo duerme poco

Trastorno mental

TRASTORNO BIPOLAR II

Episodio hipomaniaco

¿QUE ES?

Un período bien definido de estado de ánimo anormal y persistentemente elevado, expansivo o irritable, y un aumento anormal y persistente de la actividad o la energía

Para un diagnóstico

EN PRIMER LUGAR

Es necesario que se cumplan los criterios siguientes

PARA EMPEZAR

ES NECESARIO QUE:

EL CUAL

Han persistido tres (o más) de los síntomas

A CONJUNCIÓN

AL MISMO TIEMPO

Está presente la mayor parte del día, casi todos los días

TALES COMO

1. Aumento de la autoestima o sentimiento de grandeza.
2. Disminución de la necesidad de dormir
3. Más hablador de lo habitual o presión para mantener la conversación
4. Aumento de la actividad dirigida a un objetivo
5. Participación excesiva en actividades que tienen muchas posibilidades de consecuencias dolorosas.

COMO CONSECUENCIA

Los síntomas causan malestar clínicamente significativo o deterioro en lo social, laboral u otras áreas importantes del funcionamiento

Características diagnósticas

se caracteriza

por un curso clínico con episodios afectivos recurrentes

DEBE CONTENER

consistentes en uno o más episodios de depresión mayor

Al menos, un episodio hipomaniaco

EL CUAL

Debe durar al menos 2 semanas

EL CUAL

Debe durar al menos 4 días para que se cumplan los criterios diagnósticos

POR ESE MOTIVO

El episodio se asocia a un cambio inequívoco del funcionamiento que no es característico del individuo cuando no presenta síntomas

DEL MISMO MODO

El episodio no es suficientemente grave para causar una alteración importante del funcionamiento social o laboral o necesitar hospitalización.

El episodio no se puede atribuir a los efectos fisiológicos de una sustancia

Diagnóstico diferencial

Hipomaniacos o maníacos que no reúnen todos los criterios

TALES COMO

Puede acompañarse de síntomas

Trastorno depresivo mayor

Trastorno ciclotímico

Bastantes períodos de síntomas hipomaniacos y períodos de síntomas depresivos

Trastorno de pánico y otros trastornos de ansiedad

No reúnen los criterios sintomáticos o de la duración del episodio depresivo mayor.

Trastornos por abuso de sustancias

Trastorno por déficit de atención/hiperactividad

se caracterizan por períodos de síntomas psicóticos que aparecen en ausencia de síntomas afectivos prominentes.

Trastornos de personalidad

ADEMAS

La esquizofrenia, el trastorno esquizofrenia afectivo y el trastorno delirante

ALGUNOS DE ELLOS