

**Nombre de alumnos: Sheyli Velazquez Rodriguez.**

**Nombre del profesor: Bella Raquel Lopez Garcia.**

**Nombre del trabajo: Mapa Mental (Transtornos Mental)**

PASIÓN POR EDUCAR

**Materia: Psicopatología II**

**Grado: 7to Cuatrimestre**

**Grupo: A**

# TRANSTORNO MENTAL

asociados a un estrés significativo o a discapacidad, ya sea social, laboral o de otras actividades importantes.

Un trastorno mental es un síndrome caracterizado por una alteración clínicamente significativa del estado cognitivo

## TRANSTORNO BIPOLAR

## TRANSTORNO DEPRESIVO

## TRANSTORNO BIPOLAR II

## TRANSTORNO DE REGULACIÓN DISRUPTIVA DEL ESTADO DE ÁNIMO

## TRANSTORNO BIPOLAR I

diagnóstico de trastorno bipolar I es necesario que se cumplan los criterios siguientes para un episodio maniaco

El trastorno de regulación disruptiva del estado de ánimo, el trastorno de depresión mayor.

Necesario que se cumplan los criterios siguientes

Accesos de cólera graves y recurrentes que se manifiestan verbalmente

Aparición del episodio maniaco y de depresión

Episodio maniaco

Trastorno depresivo inducido por una sustancia/medicamento

Episodio hipomaniaco completo que aparece durante el tratamiento antidepressivo

Producen, en término medio, tres o más veces por semana.

Procedimientos de codificación y registro

existen tres (o más) de los síntomas siguientes

Episodio hipomaniaco

El rasgo común de todos estos trastornos

Episodio de depresión mayor

La elevación del estado de ánimo apropiada al desarrollo, como sucede en el contexto de un acontecimiento muy positivo o a la espera del mismo,

Basa en el tipo de episodio actual o más reciente, así como en la gravedad actual, la presencia de características psicóticas y el estado de remisión.

Más hablador de lo habitual

Necesita al menos un episodio maniaco a lo largo de la vida para el diagnóstico de trastorno bipolar I.

Aumento de la autoestima o sentimiento de grandeza

Facilidad de distracción

Disminución de la necesidad de dormir

Asocia a un cambio inequívoco del funcionamiento que no es característico del individuo cuando no presenta síntomas.

vacio o irritable, acompañado de cambios somáticos y cognitivos

la presencia de un ánimo triste

Cinco (o más) de los síntomas siguientes han presentes durante el mismo periodo de dos semanas y representan un cambio del funcionamiento anterior

no se ha de considerar un síntoma de manía o hipomanía.

comportamientos no se producen exclusivamente durante un episodio de trastorno de depresión mayor y no se explican mejor por otro trastorno mental.

Características diagnósticas

Episodios hipomaniacos son frecuentes en el trastorno bipolar I.

afectan significativamente a la capacidad funcional del individuo.

No incluir síntomas que se pueden atribuir claramente a una afección médica.

Este diagnóstico no puede coexistir con el trastorno negativista desafiante.

rasgo esencial es un periodo bien definido de estado de ánimo anormal y persistentemente elevado.

que la diferencia es la duración

No incluir síntomas que se pueden atribuir claramente a una afección médica.

Características diagnósticas

Un aumento anormal o persistente de la actividad

la presentación temporal o la supuesta etiología.

Características diagnósticas

rasgo central del trastorno de desregulación del estado de ánimo es una irritabilidad crónica, grave y persistente.

El estado de ánimo en un episodio maniaco se suele describir como eufórico, excesivamente alegre, alto o "sintiéndose por encima del mundo"

presencia de un episodio maniaco durante el curso de la enfermedad descarta el diagnóstico de trastorno bipolar II

Debe durar al menos 2 semanas y el episodio hipomaniaco debe durar al menos 4 días para que se cumplan los criterios diagnósticos

fluctuaciones hipomaniacas deben causar un malestar clínicamente significativo una alteración del rendimiento social.