



## Atención de Enfermería

*Nombre del Alumno: Jacqueline Damián Damián*

*Nombre del tema: Atención De Enfermería Con Alteración En La Oxigenación Tisular*

*Nombre de la Materia: Enfermería en urgencias y desastres*

*Nombre del profesor: Juan Inés Hernández López*

*Nombre de la Licenciatura: Enfermería*

*Cuatrimestre: Séptimo*

## INTRODUCCIÓN

los profesionales de enfermería son parte importante de participar en cualquier actuación del paciente crítico, la elaboración de plan de cuidados de enfermería tiene una gran importancia ya que hace posible unos cuidados de enfermería de calidad, para que el paciente pueda tener una mejoría.

# CARDIOPATIA ISQUÈMICA



Enfermedad ocasionada por la arterioesclerosis de las arterias coronarias.

- Signos y síntomas:
- Dolor torácico.
  - Falta de aire (disnea).
  - Sensación de mareo.
  - Sudor frío.
  - Náuseas y vómitos.
  - Palpitaciones.
  - Pérdida de conocimiento.
  - Dolor en la parte alta del abdomen.

- Cuadro clínico:
- Angina de pecho.
  - Infarto de miocardio.
  - Cardiopatía isquémica.
  - Muerte súbita cardiaca.

## Tratamiento

### Tratamiento farmacológico

- Aspirina.
- Antiagregantes plaquetarios
- Anticoagulantes.
- betabloqueantes
- Fármacos para evitar el dolor.
- Trombolíticos.
- Nitroglicerina.

### Tratamiento quirúrgico.

- Angioplastia o revascularización percutánea.
- Cirugía de revascularización coronaria o bypass.

### Tratamiento a largo plazo.

- Modificación de estilo de vida.
- Dejar de fumar.
- Alimentación equilibrada.
- Relajarse.
- Controlar factores de riesgo.

## Cuidados de Enfermería.

### Controlar los factores de riesgo cardiovascular educando a la población.

- Control de peso
- Una dieta cardiosaludable
- Control de TA, glucemia y colesterol
- Realizar ejercicio ligero.


### Instruir a los pacientes que ya hayan padecido angina de pecho o estén en la población de riesgo.

- Identificar las causas de la crisis para ayudar a prevenirla.
- Reforzar la importancia de acudir al centro de salud.

### Manejo extrahospitalario




- Iniciar oxigenoterapia para evitar la caída de la saturación.
- Monitorizar al paciente.
- Conseguir un acceso venoso periférico.
- Administrar antiagregantes y ansiolíticos, nitroglicerina.

# ATENCIÓN DE ENFERMERIA ANTE EL SHOCK



## Signos y Síntomas

- Piel fría y húmeda
- Piel pálida
- Tinte azulado en los labios o las uñas
- Pulso acelerado
- Respiración rápida
- Náuseas o vómitos
- Pupilas agrandadas
- Debilidad o fatiga
- Mareos o desmayos
- Cambios en el estado mental o en el comportamiento



## Atención de enfermería

Shock hipovolémico	Shock anafiláctico	Shock neurógeno	Shock cardiogénico	Shock séptico
<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Minimizar la pérdida de líquidos</li> <li>2. Contribuir a la sustitución de volumen</li> <li>3. Monitorizar al paciente</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Estimular la respiración</li> <li>2. Favorecer la sustitución de volumen</li> <li>3. Controlar las molestias</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Tratar la hipovolemia.</li> <li>2. Mantener la normotermia.</li> <li>3. Prevenir la hipoxia.</li> <li>4. Vigilar las posibles arritmias.</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Limitar el consumo de oxígeno miocárdico mediante la administración de medicamentos analgésicos y sedantes</li> <li>2. Incrementar la administración de oxígeno al miocardio</li> </ol>	<p>Este tipo de patología representa manejo especializado en las áreas de terapia intensiva, y de Urgencias, representa el manejo convencional de cualquier estado de choque y necesita trasplante inmediato</p>

### 3.3.- Atención de Enfermería en las urgencias y emergencias hipertensivas

#### Concepto:

Las crisis hipertensivas son elevaciones agudas de la presión arterial (TA) que motivan una atención médica urgente. Se definen como una elevación de la TA diastólica (TAD) superior a 120 ó 130 mmhg y/o de la TA sistólica (TAS) por encima de 210 mmhg (algunos consensos actuales hablan de TAD superior a 120 y/o de TAS por encima de 180 mmhg, aunque esto no es necesario en la práctica clínica).

#### SE DIVIDE EN 3 GRUPOS

**Emergencia hipertensiva:** elevación de la TA acompañada de daño o disfunción aguda en los órganos diana (corazón, cerebro, riñón...). Estas situaciones son muy poco frecuentes, pero entrañan un compromiso vital inmediato. Es necesario un descenso de la presión arterial con medicación parenteral y en el plazo máximo de una hora.

**Urgencia hipertensiva:** elevación de la TA en ausencia de lesión aguda de los órganos diana que no entraña un compromiso vital. Cursa de modo asintomático o con síntomas leves. Permiten una corrección gradual en el plazo de 24-48 horas y con un fármaco oral.

**Falsas urgencias hipertensivas:** elevación de la TA producida en su mayor parte por estados de ansiedad, dolor, y que no conllevan daño en órganos diana. Por lo general no precisan tratamiento específico y ceden al desaparecer el estímulo que las provocó.

#### Signos y síntomas:

- Retinianos: Visión borrosa Diplopia Exudados y hemorragias Edema de papila Constricción de arteriolas retinianas
- Cardiovasculares Dolor torácico en la espalda o abdomen Palpitaciones Náuseas y vómitos Disnea Ortopnea Estertores y sibilancias Soplos, arritmias Ritmo de galope Ruidos abdominales Pulsos periféricos anormales
- Renales Oliguria, hematuria y nicturia Dolor y sensibilidad en el flanco Edema periférico Fatiga y debilidad Agrandamiento renal
- SNC Cefalea (a veces grave) y náuseas Confusión Cambios visuales Debilidad focal o parestesias Debilidad generalizada Desorientación Déficit neurológicos focales Crisis convulsivas Coma


#### Tratamiento:

- La gravedad clínica no debe valorarse exclusivamente por las cifras de TA sino por la afectación de los órganos diana.
- Tener claro que es tan importante tratar la HTA rápidamente en una emergencia hipertensiva (tratamiento parenteral inmediato) como no tratarla de manera agresiva en el resto de los casos.
- Evitar actitudes agresivas a la hora de descender los valores de TA ya que un descenso brusco de TA que puede ocasionar isquemia de órganos vitales. La rapidez con la que debemos alcanzar valores absolutos seguros de TA es controvertida y se debe tener en cuenta el riesgo individual de isquemia del paciente.
- Es preferible una actitud expectante tras reducir las cifras de TA a 160/100 mmhg antes de intentar alcanzar valores completamente normales de TA.

**cuadro clínico:** debemos preguntar por la presencia de historia previa de hipertensión arterial (HTA): tiempo de evolución, severidad, uso de tratamiento hipotensor, adherencia terapéutica, episodios previos de crisis hipertensivas y estudios previos realizados para descartar HTA secundaria.

#### Cuidados de enfermería:

- El objetivo terapéutico en las urgencias hipertensivas consiste en reducir gradualmente la presión arterial en 24-48 horas con medicación por vía oral para evitar la hipoperfusión de órganos diana que se puede producir si las cifras de presión arterial descienden de forma brusca.
  - Reposo absoluto.
  - Tomar la T.A. frecuentemente.
  - Monitorización cardiaca del paciente.
  - Determinar la frecuencia y el ritmo del pulso.
  - Efectuar un ECG.
  - Control de constantes.
  - Vigilar los posibles efectos secundarios del tratamiento farmacológico como hipotensión, náuseas, vómitos y cefaleas
  - Realización Rx de tórax.
  - Observar el monitor cardíaco en busca de posibles alteraciones del ritmo o signos de isquemia miocárdica.
  - Observar el nivel de conciencia. Tienen riesgo de padecer hemorragia cerebral.
  - Observar si presente signos de hemorragia cerebral.





### 3.5.- ATENCIÓN DE ENFERMERÍA A PACIENTES CON ALTERACIONES DE LA CONCIENCIA

#### EVALUACIÓN INICIAL

La enfermera encargada de realizar la evaluación inicial del paciente que presenta alteración de conciencia la deberá de realizar lo más rápido que se pueda con el fin de determinar la urgencia en la atención. En esta evaluación, enfermería deberá valorar edad, estado general del paciente, así como el correcto funcionamiento del sistema respiratorio y circulatorio.

#### DEFINICIÓN

Conciencia supone un conocimiento de uno mismo y de todo lo que le rodea. Su alteración se puede presentar de forma repentina o de una manera gradual; siendo el coma el estado de conciencia considerado el más grave.

#### ENFERMERÍA: EVALUACIÓN SECUNDARIA

En esta parte de la evaluación se realizará una entrevista a los familiares del paciente con el fin de conocer reacciones alérgicas, calendario vacunación, últimos movimientos e ingestas del paciente. También se realizará una exploración física más exhaustiva valorando respuesta motora y pupilar.

#### ENFERMERÍA: EVALUACIÓN

En este apartado enfermería realizará la evaluación del paciente a través del sistema ABCDE en donde se revisa las vías aéreas, el estado neurológico y cardíaco, así como el resto de constantes vitales que puedan influir en la aparición de la alteración del estado de conciencia.

#### CUIDADOS


El profesional de enfermería deberá orientar sus cuidados dependiendo del grado de alteración de la conciencia; teniendo en cuenta edad y funcionamiento del sistema respiratorio y circulatorio. Para ello deberá realizar una serie de evaluaciones del paciente.

#### ENFERMERÍA: EVALUACIÓN TERCIARIA

Esta evaluación consiste en completar y realizar todas las exploraciones y pruebas que en los apartados anteriores no se han podido llevar a cabo por la gravedad de la situación. Además, se comenzará a administrar el tratamiento adecuado para el paciente. Este tratamiento será específico para la etiología causante de la alteración de conciencia; a lo largo de las anteriores etapas de evaluación el paciente será sometido a diferentes tratamientos para conseguir estabilizarlo.

#### RECOMENDACIONES

La alteración del estado de la conciencia suele producirse con episodios de breve duración que en algunos casos puede desencadenar en situaciones de urgencia. Los profesionales de enfermería deberán llevar a cabo una serie de evaluaciones con el fin de revertir el episodio y evitar complicaciones asociadas.





# Atención de enfermería al paciente con enfermedad cerebrovascular

Es

Un accidente cerebrovascular sucede cuando el flujo de sangre a una parte del cerebro se detiene. Algunas veces, se denomina "ataque cerebral". Si el flujo sanguíneo se detiene por más de pocos segundos, el cerebro no puede recibir nutrientes y oxígeno.

Los

## Signos y síntomas

son

- Dificultad para hablar y entender
- Parálisis o entumecimiento de la cara, el brazo o la pierna.
- Problemas para ver en uno o ambos ojos
- Dolor de cabeza
- Problemas para caminar

El

## Cuadro Clínico

son

- Entumecimiento o debilidad en la cara, un brazo o una pierna, especialmente en un solo lado del cuerpo.
- Confusión o problemas para hablar o comprender.
- Problemas para ver con uno o ambos ojos.
- Problemas para caminar, mareos o pérdida de equilibrio o coordinación.

El

## Tratamiento

para

El tratamiento temprano con medicamentos como TPA (es un tipo de trombo-lítico sistémico) él puede minimizar el daño en el cerebro

### Fisioterapia

Restaura la fuerza y la función muscular mediante el ejercicio.

**Medicamentos** para controlar los factores de riesgo, como la presión arterial alta, la diabetes y el colesterol alto.

Los

## Cuidados de enfermería

que

- Constante observación
- Monitoreo de los signos vitales
- Conservar adecuada ventilación y oxigenación
- Valorar la movilización de los miembros
- Vigilar y reportar el estado de conciencia

# ARRITMIAS CARDIACAS

## Bradiarritmia

### BRADICARDIA INUSUAL

ES

50-60 lpm resulta de una falla en la generación o la conducción de impulso

#### ESTATEGIA

ADM.MEDICAMENTOS  
(BLOQUEADORES, BETA ANTAGONISTAS DE CALCIO.

ASPIRACION ENDOTRAQUEAL

ALTO NIVEL DE ENTRETENIMIENTO

#### DIAGNOSTICO

##### ECG

ELECTRITOS SERICOS

GAOMETRIA ARTERIAL

#### TRATAMIENTO

CORREGIR DESORDENES AGREGADOS

ATROPINA SI HAY BAJO GASTO

MAREO,VERTIGO,SINCOPE,ATURDIMIENTO ,FATIGA,LETARGA, DISNEA,DOLOR PRECORDIAL,INCAPACIDAD MENTAL,CRISIS DE ADAM STOKES

### BLOQUEO AV

ES

TRASTORNO DONDE LOS IMPULSOS ARTICULARES NO SON O SON CONDUCIDAS CON RETRASO A LAS VERTIICULOS

#### 1°GRADO

#### 2°GRADO

#### 3°GRADO

#### SINTOMAS

#### DIAGNOSTICO

#### TRATAMIENTO

##### ECG

ELECTROLISTOS SERICOS

GASOMETRIA ARTERIAL

COLOCACION DE MARCAPASOS TEMPORAL O PERMANENTE EN BLOQUE 2°

ATROPINA


**HIPOTOROIDISMO**

HIPOTERMIA

PROCESOS INFLAMATORIOS (PERICARDITIS, MIOCARDITIS, CARDIOPATIA REUMATICA, ALTERAL LA FUNCION DEL NODO Y FORMAN FIBROSIS

# ARRITMIAS CARDIACAS

## TAQUIARRITMIA



## CONCLUSIÓN

Es muy importante conocer la atención de enfermería que se debe tener a pacientes con problemas tisulares y como llevar al paciente a una mejora, ya que existen signos y síntomas que servirán como referencia para poder dar un cuidado mucho más preciso y sobre que el estudiante pueda conocer sobre sus cuidados.