



TEMA: TIPOS DE VACUNAS

**MATERIA: ZONOSIS Y SALUD PUBLICA
VETERINARIA**

**PROFESOR: BARREDA ROBERTO GARCIA
SEDANO**

ALUMNO: ERNESTO MARTINEZ ESPINOSA

**ACTIVIDAD.2 PARCIAL 3 CUATRIMESTRE 4:
CUADRO SINOPTICO "LEPTOSPIRA"**



LEPTOSPIROSIS

ETIOLOGIA

La leptospirosis es una enfermedad zoonótica de potencial epidémico, principalmente después de lluvias fuertes, causada por una bacteria llamada leptospira. *Leptospira interrogans* es patogénica para los hombres y los animales, con más de 200 variedades serológicas o serovariedades.

SIGNOS CLINICOS

Los síntomas de la leptospirosis se pueden presentar desde 2 días hasta 4 semanas después de haber estado expuesto a las bacterias.

Los síntomas comunes de la leptospirosis incluyen los siguientes: Fiebre, Escalofríos, Dolor de cabeza, Dolores musculares, Vómitos, Diarrea, Dolor abdominal, Ictericia (piel y ojos amarillentos), Sarpullido, Ojos enrojecidos.

DIAGNOSTICO

El diagnóstico de la leptospirosis debe ser considerado en cualquier paciente que presente fiebre súbita, escalofríos, inyección conjuntival, dolor de cabeza, mialgia e ictericia. Historia de exposición ocupacional o recreacional a animales infectados o a un ambiente posiblemente contaminado con orina de animales.

TRATAMIENTO

Los medicamentos para tratar la leptospirosis incluyen: Ampicilina, Azitromicina, Ceftriaxona, Doxiciclina, Penicilina

Los casos complicados o graves pueden necesitar tratamiento complementario. Podría necesitar tratamiento en una unidad de cuidados intensivos (UCI) de un hospital.

VIAS DE CONTAGIO

Los seres humanos también pueden adquirir la enfermedad por contacto directo o indirecto con la orina de personas o perros infectados. La bacteria puede entrar al cuerpo humano por la comida o el agua, por una cortadura en la piel, o a través de membranas mucosas (ojos, nariz, boca o ano).