



UNIVERSIDAD DEL SURESTE UDS



DIEGO ALBERTO REYES VELAZQUEZ

Nombre del alumno

MEDICINA VETERINARIA Y ZOOTECNIA

Licenciatura

FISIOLOGIA DE LA REPRODUCCION ANIMAL II

Asignatura

CUADRO SINOGTICO DE TRICOMONIASSI

Actividad

31 DE OCTUBRE DEL 2021

TRICOMONIASIS

SE LOCALIZA

EN TOROS

Se localiza en la superficie de la mucosa peniana, Y en el saco prepucial

EN VACAS

se localiza en la vagina y en el útero, abundan en el pus de las piometras, y en las secreciones que acompañan al aborto

SE TRANSMITE

Es una enfermedad venérea que se transmite del toro a la vaca y recíprocamente a partir de las uniones sexuales, también se puede transmitir por inseminación

Es una enfermedad de transmisión sexual causada por un protozoo, Trichomonas foetus Continúa siendo un problema reproductivo prevalente en rebaños de carne que utilizan de manera importante la monta natural, también afecta a los bovinos, principalmente en los órganos genitales de vacas y toros, y que puede ser transmitida por la copula, o a través del material de inseminación artificial con semen contaminado

LESIONES

EN TOROS

Lesiones de la tricomoniasis en el aparato genital del toro son de escasas importancia y no llegan a interferir la capacidad fecundante del

EN VACAS

Casos no complicados hay Cervicitis y Endometritis con abundante exudado purulento

DIAGNOSTICO

EL Diagnóstico de rutina es el cultivo de muestras prepuciales, fetales o vaginales en medios ad hoc y el examen microscópico directo